

Deze aanvullende informatie is zoals aangeleverd door de auteurs; ze is niet inhoudelijk of taalkundig bewerkt door de redactie van het *Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde*.

Gradering reactie naar ernst van de reactie en behandeladvies adrenaline (Sampson, 2003)

Graad	Huid / mucosa	Gastro-intestinaal	Respiratoir	Circulatoir	Neurologisch	Initiële behandeling
1	Lokaal: jeuk, flushing, urticaria, angio-oedeem	Orale jeuk of prikkeling, buikpijn	-	-	-	Oraal anti-histaminicum
2	Gegeneraliseerd: jeuk, flushing, urticaria, angio-oedeem	Een van bovenstaande + misselijk, 1x braken, kortdurende koliepijnen	Niezen, milde neusverstopping	-	Veranderde activiteit	Oraal anti-histaminicum Indien meerdere symptomen aanwezig en/of snelle progressie bij een bekend allergeen: overweeg adrenaline i.m.
3	Een van bovenstaande	Een van bovenstaande + > 1x braken, persisterende koliepijnen	Rhinorrhoe, neus fors verstopt, jeuk in keel of gevoel van zwelling in keel	Tachycardie	Veranderde activiteit, angst	Indien meerdere symptomen aanwezig en/of snelle progressie bij een bekend allergeen: overweeg adrenaline i.m.
4	Een van bovenstaande	Een van bovenstaande + diarree	Een van bovenstaande + heesheid, blafhoest, stridor, moeite met slikken, dyspnoe, piepen, cyanose	Een van bovenstaande + milde hypotensie, ritmestoornis	Onheilspellend gevoel, "licht in het hoofd"	Adrenaline i.m.

5	Een van bovenstaande	Een van bovenstaande + onhoudbare diarree, urine incontinentie	Een van bovenstaande + status asthmaticus, ademstilstand	Forse bradycardie, hypotensie, hartstilstand	Bewustzijnsverlies	Adrenaline i.m.
---	----------------------	---	---	---	---------------------------	------------------------

Niet alle symptomen hoeven tegelijk aanwezig te zijn.

Het symptoom van de meest aangedane tractus bepaalt de ernst van de reactie.

Blauw: overweeg toedienen van adrenaline (indien meerdere symptomen aanwezig zijn en/of snelle progressie bij bekend allergeen).

Rood: absolute indicatie voor toedienen van adrenaline.