

INGEZONDENSTUK.

DE NIEUWE WIJZE VAN BEHANDELING DER ANEURYSMATA, door **J. E. van der Meulen**, in het laatste nummer van het *Tijdschrift* medegedeeld, geeft mij, daar aan het historisch gedeelte zooveel plaats wordt gewijd, aanleiding tot de volgende bijvoeging.

VELPEAU vertelt in zijne *Nouveaux éléments de médecine opératoire*, hoe hij bij het verrichten van een dierexperiment opmerkte, dat een speld, die toevaltig in de arteria femoralis gedrongen was, obliteratie veroorzaakte. Naar aanleiding dezer waarneming trachtte hij methodisch door acupunctuur arteriën te sluiten en slaagde hierin zoover, dat hij de hoop uitsprak, aneurysmata te genezen, door naalden, spelden of metaaldraden in verschillende richtingen door den aneurysmatischen zak heen te voeren.

De Engelsche Chirurg B. PHILIPPS, die in 1830 deze experimenten te Parijs zag, herhaalde ze te Londen, en genas aldus een aneurysmatisch gezwel der parotis-streek

Dr. JAMESON te Baltimore, en AMUSSAT trachtten op analoge wijze met draad, en de eerste ook met stukjes hertevel, obliteratie van arteriën bij dieren te bewerkstelligen (COOPER's *Surgical Dictionary*, Art. *Aneurism*).

In het *Centralblatt für Chirurgie*, 1878, pag. 79, vindt men een referaat over eene mededeeling van ROBERTS uit de *Philadelphia med. Times*, 1877, pag. 410. Deze schoof, volgens de methode van LEVIS, door middel van een troicart gereinigde, 16" lange, gekrulde paardeharen in het aneurysma, evenwel zonder voldoende gevolg.

In denzelfden Jaargang, pag. 848 vindt men ten laatste eene nieuwe methode voor de behandeling van aneurysmata der Aorta ascendens, door G. BACELLI in 1877 aangegeven.

Deze nieuwe methode bestaat hierin, dat door een ingestoken fijne troicart horlogie-veeren in het aneurysma geschoven worden. BACELLI opereerde op deze wijze twee patiënten. Het eerste geval werd reeds medegedeeld door QUINCKE in ZIEMSEN's *handboek* Bd. 6.

Bij het tweede geval schoof hij 3 veeren van 1 m.m. breed en te samen 110 ctm. lang in den zak, waarvan de inhoud spoedig daarna stolde. Na 10 dagen stierf patiënt, waarschijnlijk tengevolge van een embolus.

Amsterdam, 30 Mei.

Dr. J. A. KORTEWEG.



B E R I G T E N .

BUITENLAND.

LONDEN. — In de Engelsche bladen worden giften gevraagd voor den uitvinder van de bekende koortstinctuur, Dr. WARBURG, welke in groote armoede verkeert. Prof. MACLEAN van de Netleyschool betoogt bij die hulpbede het nut, dat door dit middel