

ruimt, voor alle slechts kort bestaan hebbende gevallen, aan de endonasale behandeling, i. e. de sondeering en doorspoeling der holte, de eerste plaats in. Bij alle chronische etteringen echter is de eenige weg de radicaal-operatie van buiten, waarvoor Schrijver een nieuwe methode aangeeft. Hij heeft hierbij principiëel de vernietiging van het geheele slijmvlies der holte ten doel; want in vele gevallen is alleen op die wijze de genezing mogelijk. Hij verwijdt daartoe den geheelen voorwand van den sinus, en krabt het slijmvlies met den scherpen lepel weg. Dan wordt de holte, met uitzondering slechts van een drainage-opening, door hechtingen gesloten. Onder dagelijksche uitspoelingen met sublimaat is na 3, 4, 5, hoogstens 6 weken, de genezing volkomen. Van een ongunstig cosmetisch effect is geen sprake. De te verwachten inzakking op het voorhoofd ontstaat niet.

Daar Schrijver dit resultaat, dat in vergelijking met dat van alle tot nogtoe gebruikte methoden schitterend moet worden genoemd, in 12 gevallen zonder uitzondering heeft verkregen, hebben wij reden hierin de operatie der toekomst te zien. Aan de hand van dit resultaat is Schrijver ook volkomen in zijn recht, wanneer hij de eertijds zeer beperkte indicatie voor de operatie van buiten belangrijk uitbreidt en ze ook bij het z.g. latente, chronische empyeem onmiddellijk toepast.

H. BURGER.

INGEZONDEN.

Geachte Redacteur!

In den laatsten tijd bleek meermalen, dat jodoform-gaas van den handel niet voldeed aan de te stellen eischen, hetgeen hoofdzakelijk zijn reden had in de wijze van steriliseeren, waardoor de jodoform gemakkelijk ontleed wordt en het dus moeilijk is, een constant jodoform-gehalte van het steriele gaas te effectueeren. De onderzoekingen van Dr. GRESHOF (destijds te Batavia) en van Apotheker G. B. SCHMIDT (Amsterdam) constateerden verschillende afwijkingen in het gehalte door den fabrikant vermeld.

Zoo vond SCHMIDT bijv. voor 10 pCt gaas, cijfers variërende tusschen 6.21 pCt. en 7.76 pCt. jodoform (zie *Pharmac. Weekblad* van 21 Juli 1894, n^o. 12); voor 20 pCt. jodoformgaas, cijfers variërende tusschen 9.87 pCt. en 12.5 pCt.

Oorzaken hiervan liggen deels in de bereiding, deels in de berekening door de fabrikanten. Daar namelijk het gewicht van het gaas per M² kan variëeren tusschen 20 en 40 gr., zal men, de redeneering der fabrikanten volgende: 100 gr. gaas + x gr. bindmiddel + 10 gr. jodoform = 10 pCt. jodoform-gaas, niet altijd hetzelfde gehalte aan jodoform per M² verkrijgen, maar zal dit gehalte bij licht gaas geringer zijn dan bij zwaar gaas.

Door een andere methode van sterilisatie, en door een andere berekening te volgen, werd nu door de Apothekers HILLEN (Arnhem) en Dr. G. ROMIJN (Apeldoorn) een jodoform-gaas bereid, waarbij een bepaalde hoeveelheid jodoform per vlakke-eenheid aanwezig is; zij vonden in overeenstemming met de Pharm. Neerl. Ed. III, dat voor 5 pCt. gaas der Pharm. per strekkenden meter bij 80 cM. breedte, 1.5 gram jodoform noodig was. In overeenstemming hiermede voor 10 pCt. gaas 3.1 gr. en voor 20 pCt. 7.2 gr.

De sterilisatie geschiedt in de pakflesch na sluiting met een kurk, vooraf gedrenkt in kokende paraffine.

Proeven, door Dr. G. ROMIJN genomen, hebben bewezen, dat het gaas volkomen aseptisch is.

Deze methode volgende, hebben zij een jodoform-gaas vervaardigd met de volgende eigenschappen: volkomen en blijvend steriel jodoform-gaas; bijna volkomen gelijkmatige verdeling van jodoform en constant jodoformgehalte.

Den medicus is het hierbij mogelijk gemakkelijk de hoeveelheid jodoform, die hij wil gebruiken te bepalen.

De hoeveelheid is verdeeld in pakflesschen van $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ en 1 M. jodoform-gaas, benevens 1 M. verdeeld in 16 compressen, waardoor de toepassing ook gemakkelijk wordt gemaakt.

Arnhem, Augustus 1895.

TH. WEYNEN.

BERICHTEN.

BUITENLAND.

NEW-YORK. — **De nieuwe vrouw.** In *The medical Record*, p. 177, houdt Dr. MILLER een beschouwing over dameskleding. Van corsetten wil hij niets zeggen; dat helpt toch niet. Maar de rokken, die juist tot de zoo kwetsbare bekkenorganen koude en wind ongestoord toelaten, wil hij gaarne vervangen zien door de rok-pantalons der zoo bespotten „nieuwe vrouwen”. Ook het wielrijden acht hij nuttig; althans beter dan het thuiszitten, dat neurasthenie en anaemie teweegbrengt. Koeien — zoo merkt hij galant op — en merries zijn niet vaker ziek dan stieren en hengsten. Dit kon bij den mensch ook zoo zijn!

LONDEN. — **Huldebetoon.** Bij zijn afscheid van het professoraat aan Kings College Hospital is aan LISTER een door LORIMER geschilderd portret van hemzelve aangeboden, bij monde van zijn ouden leermeester ERICHSEN, en in tegenwoordigheid van vele beroemdheden, o. a. STOKES, JOHNSON, SPENCER WELLS EN PLAYFAIR. (*Progrès médical*, p. 94).

PARIJS. — **Erflating.** De weduwe van DAVAINHE heeft een deel van haar vermogen aan de armen vermaakt en haar landgoed te Garches bestemd tot een herstellingsoord voor meisjes, die het ziekenhuis verlaten. (*Brit. med. Journal*, p. 450).

— **Bacterium coli** is te Rijssel door CALMETTE in het drinkwater ge-