

te stelpen en bij acute uterus-gonorrhoe en puerperale endometritis om de coccen te doodden. De stoom stroomt door een uterus-katheter naar binnen en veroorzaakt na 2 minuten een totale necrose van het slijmvlies, dat 9 dagen later als een buisvormig afgietsel wordt uitgestooten. Om deze totale necrose met opvolgende atresie van het cavum uteri bij jonge individuen te voorkomen, raadt hij aan bij deze de vaporisatie hoogstens $\frac{1}{4}$ minuut te doen geschieden. De behandeling geschiedt zonder narcose en is pijnloos.

H. TIMMER.

J. WESTERMAN.

INGEZONDEN.

Aan de Redactie van het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde.

Geachte Redactie!

De Commissie uit de Ned. Maatschappij ter bevordering der Pharmacie voor het onderzoek van specialités verzoekt U beleefd onderstaand Rapport 1) te willen opnemen in uw *Tijdschrift*, waarvoor zij U bij voorbaat dank zegt.

Rapport van de Commissie voor het onderzoek van Specialités.

SCOTT'S emulsion.

Neem:

Levertraan	56	gram
Poeder van arabische gom	2	„
Zéér fijn poeder van tragacanth	1.75	„
Glycerine	18	„
Calciumhypophosphiet.		
Natriumhypophosphiet . . . van elk	0.63	„
Gedestilleerd water	82	„
Kaneelolie	5	druppels

Tamarinde-bonbons.

Neem:

Tamarinden-moes	50	gram
Poeder van sennebladen	30	„

Meng dit en maak er 20 bonbons van, die, na gedroogd te zijn, in gesmolten chocolade gerold en, voordat deze laatste gestold is, met kristalletjes van kandijnsuiker bestrooid worden.

1) Het behoeft nauwelijks gezegd, dat de Redactie zich haast om het haar aangeboden Rapport te publiceeren.

Sublimaatpastilles of -staafjes.

Deze worden bereid uit gelijke deelen sublimaat en chloornatrium en gekleurd met eosine.

Om verwisseling met andere staafjes te voorkomen, verdient het aanbeveling den zes- of achthoekigen vorm te gebruiken.

*Dragées Demazière
à la cascara sagrada.*

Men neme fijn poeder van Cort. Rhamni purshiani en make daar, met tot dikke consistentie uitgedampt vloeibaar extract van denzelfden bast, pillen van, ieder wegende 125 mGr.

Deze pillen worden op de bekende wijze gecandeerd en ten slotte met een laagje spiritueus aftreksel van curcuma, onder suikerpoeder gewreven, gekleurd.

*ERLENMEYER'S Bromwater.
(ERLENMEYERS Bromwasser)*

Neem:

Kaliumbromide	5.3 dln.
Natriumbromide	5.3 „
Ammoniumbromide	2.6 „
Sterk koolzuurhoudend water800. „

Vul met deze vloeistof champagneflesschen.

Solutio Ferri aromatic. dialys. Mooy.

Neem:

Gedialyseerd ijzeroxyde in oplossing (5 pCt.).	25 dln.
Glycerine	20 „
Kaneelwater	10 „
Water	46 „

Meng ze.

Haematogeen.

Men neemt runderbloed, bevrijdt dit door kloppen van de vezelstof en coleert het daarna door een doek. In een flesch gegoten, voegt men minstens een derde volumenaether bij, schudt de vochten eenige keeren goed dooreen, giet ze in een scheidrechtter en laat ze nu eenige dagen rustig staan.

Vervolgens scheidt men de vloeistof van den bovendrijvenden aether en dampt het heldere vocht, onder zachte verwarming, nu en dan voorzichtig omroerend, bij 30° a 33°, tot op $\frac{3}{4}$ van het volumen uit. Daarna wordt er 20 pCt. glycerine en 10 pCt. malagawijn bijgevoegd.

Het praeparaat wordt afgeleverd in bruine fleschjes van 100 cM³ inhoud, welke vooraf gesteriliseerd zijn en met gesteriliseerde kurken gesloten worden.

De Commissie vertrouwt, dat de geneeskundigen, welke de in bovenstaand Rapport genoemde praeparaten voorschrijven, er de voorkeur aan zullen geven, dat deze bereid worden door den apotheker zelf volgens de door de

Commissie gepubliceerde voorschriften, waardoor de medici de zekerheid hebben, dat deugdelijke praeparaten van bekende samenstelling worden afgeleverd.

Namens de Commissie bovengenoemd:

H. M. J. E. STEIJNS, *Voorzitter.*

J. C. VAN DER HARST JJZ., *Secretaris,*

Geachte Redactie!

Zoudt ge wellicht ter voorkoming van misverstand aan het onderstaande een plaatsje kunnen inruimen?

Op bladz. 707 van dit *Tijdschrift* eindigt collega HARTEVELT zijn referaat over „Testikel-extract en spierarbeid” met de opmerking, dat ZOTH „zich „wat al te gemakkelijk afmaakt van de mogelijkheid eener suggestieve werking, die bij spierarbeid onder dergelijke omstandigheden zeker niet is uit „te sluiten”, en beklagt er zich over „dat het aantal proefnemers zich tot „slechts twee beperkt heeft, van wie één de schrijver zelf was”. Inderdaad zouden deze opmerkingen volkomen juist zijn, indien de experimentatoren van het laboratorium te Graz niet reeds vroeger proeven hadden genomen over den invloed van testikel-extract op den spierarbeid, onder opzettelijk zoodanig gekozen voorwaarden, dat alle suggestieve invloed kon worden buitengesloten. (PREGL. Zwei weitere ergographische Versuchsreihen ueber die Wirkung orchitischen Extracts. PFLÜGER'S *Archiv*, Bd. 62, S. 379). Twee studenten, die volkomen onkundig werden gelaten met den aard en het doel der inspuitingen, en die zich o. m. ook vrijwillig verbonden hadden met niemand en vooral niet met elkander over de proeven te spreken, ontvingen afwisselend gedurende een zekeren tijd, de één inspuitingen van testikel-extract met chloornatrium-oplossing, de andere daarentegen glycerine met chloornatrium-oplossing in zoodanige verhouding, dat na beide inspuitingen nagenoeg hetzelfde gevoel van branding ontstond. De door hen geschreven ergographische curven werden door een scherm aan hun oog onttrokken. Het resultaat der talrijke op verschillende wijzen gevarieerde proeven was volkomen in overeenstemming met dat van ZOTH, en PREGL kon m. i. te recht concludeeren: niet door suggestie, maar door de in het orchitisch extract voorhandene werkzame stoffen, moet de toeneming in arbeidsvermogen worden verklaard. ZOTH heeft waarschijnlijk deze, door zijnen collega beschreven proeven als bekend verondersteld, en is er daarom in zijn later, door collega HARTEVELT gerefereerd artikel niet op terug gekomen.

Met beleefden dank voor de afgestane plaatsruimte.

Collegialiter
SCHEFFER.
