

een afzonderlijke 10 grams spuit voor de inspuiting der dikke vloeistof. De sterkere verbindingen worden vóór het gebruik verwarmd om vloeibaarder te worden. Hij spuit meestal in de huid van den rug in. SCHUSTER (*Die Medicin Woche* 3 Aug. 1900) verkiest de glutaestreek, die minder pijnlijk zou zijn. Ontstaat pijnlijke zwelling, dan wijkt zij voor koude omslagen. De steekwond wordt met collodion of hechtpleister afgesloten.

PINKHOF.

**De aspiratiedrainage bij empyema thoracis.** — In de op 3 Mei 1901 gehouden zitting der Gesellschaft der Aerzte te Weenen (zie *Wiener klin. Wochenschrift* n<sup>o</sup>. 19, 1901) heeft R. FRANK een patiënt voorgesteld, die, onder behandeling gekomen met empyeem, door toepassing der methode van BUHLAU genezen was; de voorstelling had voornamelijk plaats, om te doen uitkomen, dat deze behandelingswijze veel te weinig wordt aangewend. FRANK behandelde zoo 21 patiënten, waarvan 9 volkomen genezen, hoewel het bacteriologisch onderzoek bij 4 daarvan influenza-bacillen en ééns tuberkel-bacillen als oorzaak deed kennen; 8 werden met een fistel ontslagen en 4, allen lijdende aan tuberculeus empyeem, stierven. Voor deze methode pleit volgens FRANK, dat zij zonder narkose uitgevoerd kan worden, dat er geen plotselinge ontleding van den thorax plaats heeft en er geen pneumothorax ontstaat, dat zij zindelijk is en ook door niet-chirurgen verricht kan worden. Zij is veel minder gevaarlijk dan thorakotomie met of zonder ribresectie, terwijl zij hetzelfde praesteert. Slechts voor die gevallen, waar zij in den steek laat, past de multipele ribresectie met thorakoplastiek.

In de naar aanleiding dezer voordracht gevoerde discussie wees V. GERSUNY er op, dat ook de thorakotomie met of zonder ribresectie niet in narkose verricht wordt. Door de plotselinge ontleding van den thorax met opvolgend indringen van lucht wordt voorkomen, dat er negatieve druk ontstaat en daardoor hartzwakte, hoestprikkel, longoedeem, enz. Hij gaf toe, dat de methode van BUHLAU knap bedacht en eenvoudig is, doch ontkende, dat zij de normale behandelingswijze zou zijn. Door de aanwezigheid van groote fibrinestolsels wordt zij reeds onbruikbaar. Men zou haar de methode voor de inwendige kliniek kunnen noemen; zij kan slechts in eenvoudige, ongecompliceerde gevallen worden aangewend.

D. H. KOETSER.

---

## INGEZONDEN.

---

VIRCHOW-HULDE.

De commissie heeft de eer te berichten, dat sedert haar vorige opgave nog bij haar zijn ingekomen bijdragen van de *Ned. Maatschappij tot bevorde-*

*ring der Geneeskunst*, van Prof. M. STRAUB, van Prof. TH. PLACE, van Prof. VEIT, van Dr. W. POSTHUMUS MEYJES, van Dr. OLIVIER.

Zij rekest nog verder op talrijke bijdragen (ook een klein bedrag is haar welkom) van Nederland's medici, opdat, nu de VIRCHOW-hulde in alle landen zooveel sympathie ondervindt, ook ons land op waardige wijze van zijn ver-eering voor den grooten medicus en anthropoloog doe blijken.

*Namens de Commissie:*

B. J. STOKVIS.

P. MUNTENDAM.

---

## BERICHTEN.

---

### BUITENLAND.

**PEST. — Turkije.** In Bassora zijn 26 April drie personen ziek geworden met verschijnselen, die aan pest deden denken. In het huis van twee ervan zijn doode ratten gevonden. In Konstantinopel is 30 April een fabrieksarbeider aan pest ziek geworden. Den 2den Juli is nog één en den 5den Juli zijn twee nieuwe gevallen van pest voorgekomen.

Te Bagdad is den 6den Mei een vrouw aan pest overleden.

**EGYPTE.** — Nadat in Alexandrië sinds 11 November 1900 geen gevallen van pest waren voorgekomen, is den 9den April een nieuw geval geconstateerd en 28 Juni nog zes, waarvan 5 overleden. In de provincie Charkieh, in het binnenland van Egypte, kwamen van 2 tot 28 Juni 56 gevallen van pest voor, waarvan 22 overleden. Ook in andere deelen van Egypte, o. a. in Port-Said zijn eenige gevallen waargenomen.

**BRITSCH-INDIË.** — In de provincie Bombay bereikte de pestepidemie in de week van 9 tot 15 Maart haar hoogste punt met 2863 ziektegevallen en 2315 sterfgevallen. Sedert is de epidemie aan het dalen; in de week van 25—31 Mei 861 zieken en 717 dooden. In het geheel zijn in die 12 weken 19747 personen aan pest ziek geworden en 16176 gestorven. In Calcutta zijn van 25 Mei tot 1 Juni 103 ziektegevallen en 97 sterfgevallen voorgekomen.

**CHINA.** — Te Hongkong is de epidemie toegenomen: in de week van 9—16 Februari kwamen voor 3 ziektegevallen met even zooveel sterfte en in de week van 11—18 Mei 122 ziektegevallen en 113 sterfgevallen. In het geheel in dien tijd 532 ziektegevallen, waarvan 493 met doodelijken afloop.

**JAPAN.** — In het begin van het jaar is de epidemie op Formosa weer toegenomen. In Januari en Februari 162 ziektegevallen en 125 sterfgevallen.

**PHILIPPIJNEN.** — In Januari zijn in Manilla 7 nieuwe pestgevallen en 5 sterfgevallen voorgekomen.

**AUSTRALIË.** — In Brisbane (Queensland) is den 2den Maart een pestgeval voorgekomen en sinds dien tijd tot 25 Mei nog 22, waarvan twee overleden zijn. Ook in West-Australië zijn 26 gevallen voorgekomen.