

INGEZONDEN.

KOUDE RILLING NA COLLARGOLINSPUITING.

Hoewel ik zelf geen ervaring heb van collargolbehandeling bij zieken met koorts, wil ik op zijn verzoek de aandacht van collega G. BERG vestigen op een artikeltje van E. ARONSOHN in de *Therapie der Gegenwart* van Maart 1908, getiteld: „Ueber die medicamentöse Therapie der Gegenwart”. Hij schrijft hierin over collargol, dat op de intramusculaire inspuiting van collargol binnen twee uren een stijging der lichaamswarmte volgt tot op 41° ; deze wordt gevolgd door een daling der temperatuur tot 37° in den tijd van acht tot twaalf uren. ARONSOHN meent, dat die collargolinspuitingen genezend kunnen werken; en het metaalmolecuul en de sterke temperatuurstijging zouden dit veroorzaken.

Amsterdam, 6 Juli 1919.

A. CIJFER.

BRIEFWISSELING.

HET ZIEKENFONDS VOOR DEN ARBEIDENDEN STAND TE DEVENTER.

Door een samenloop van omstandigheden is de advertentie in ons vorig nummer, waarin sollicitanten worden opgeroepen voor de vervulling der vacature van huisarts aan het ziekenfonds voor den arbeidenden stand te Deventer, aan het speurend oog onzer redactie ontgaan en is zij in ons advertentieblad binnengeslopen zeer tegen onzen zin. Het spreekt van zelf, dat velen zich aan die advertentie zullen hebben geërgerd, aangezien onze Maatschappij meermalen tegen het zich verbinden aan genoemd ziekenfonds heeft gewaarschuwd, zooals ook thans weer geschiedt op bldz. 91 van het nummer van deze week. Slechts per abuis en tegen onze bedoeling is die advertentie opgenomen. Wij hebben maatregelen genomen om een herhaling daarvan te voorkomen.

Redactie.

BERICHTEN.

Wetten, Besluiten, Officiële verslagen, enz.

De sterfte aan Spaansche griep in Mei 1919.

In de Nederlandsche Staatscourant van 1 Juli 1919, no. 145, is alweer een overzicht opgenomen, opgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, van de sterfte aan influenza, acute bronchitis, bronchopneumonie, croupeuse pneumonie en aandoeningen der pleuraholte, thans over de maand Mei 1919, vergeleken met de vorige overzichten, waarop het een vervolg vormt.

Kon in de maand April bij de sterfte aan zoo goed als alle genoemde doodsoorzaken slechts een geringe vermindering worden vastgesteld, in Mei was die vermindering veel sterker. Ook de sterfte aan aandoeningen der pleuraholte, die in April, vergeleken met Maart, eenigszins was toegenomen, is in Mei weder tot het peil van Maart gedaald, n.l. gemiddeld één sterfgeval per dag. Aan eigenlijke influenza stierven in de genoemde maand 77 personen tegen nog 204 in April, een vermindering derhalve tot op een groot derde deel. Acute bronchitis, met in Mei 94 sterfgevallen, veroorzaakte de helft van het aantal sterfgevallen van April, terwijl aan pneumonie in Mei $\frac{2}{3}$ van het aantal in April stierven. Toch zijn ook thans nog, zooals onderstaande cijfers doen zien, met uitzondering van de acute bronchitis, de cijfers nog verre van normaal, al bedraagt de totale sterfte aan de genoemde oorzaken slechts $\frac{1}{14}$ van die van November 1918, de maand met de hoogste sterfte.