

In een tijd, dat zoetigheid weinig gebruikt kon worden; zoo durft de schrijver tot de uitspraak te komen, dat als het mocht gelukken de snoepzucht den kop in te drukken, wij dan reeds in één geslacht komen zouden tot een even goeden toestand der tanden, als deze voor 100 jaar geleden bestond.

GESLACHTSZIEKE ZEELIEDEN. De *Office International d'Hygiène Publique* heeft zich in zijn laatste zitting beziggehouden met de behandeling van geslachtszieke zeelieden der koopvaardij. Een plan is ontworpen om in de voornaamste havens van alle landen, die bij den Volkerenbond zijn aangesloten, de gelegenheid voor hen open te stellen, om gratis de noodige behandeling te krijgen. Door middel van een ziektegeschiedenis, die door de verschillende artsen zal worden bijgehouden, is steeds iedere nieuwe arts op de hoogte van de ziekte en van de ingestelde therapie van den zieke.

BRENKMAN.

BEROEPSBELANGEN.

ZIEKTEVERZEKERING IN CZECHO-SLOWAKIJE. — Volgens *L'avvenire Sanitario* is in Czecho-Slowakije verplichte ziekteverzekering ingevoerd met vrije artsenkeus, een welstandsgrens van 20000 kronen en recht op geneeskundige behandeling gedurende 26 weken van het jaar.

VEROORDEELING WEGENS ONWARE GENEESKUNDIGE VERKLARING. — De arts uit Zevenbergen, die onlangs terecht stond, is tot een week gevangenisstraf veroordeeld.

PINKHOF.

INGEZONDEN.

DE TETRAËDRISCHE BORSTKAS.

Nu ROMBACH opnieuw de aandacht vestigt op de tetraëdrische borstkas, lijkt het mij van belang mede te delen, dat in het *Lehrbuch der Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten* van OTTO KÖRNER (derde druk, 1912) op bldz. 72 een mooie photo staat van den eigenaardigen borstkas-vorm (bij een volwassen man), waaraan prof. HIJMANS VAN DEN BERGH den typeerenden naam van „tetraëdische” gaf. KÖRNER geeft als onderschrift: „Thoraxveränderung infolge van Hyperplasie der Rachenmandel”. En in den tekst zegt hij, dat de borstkaswelving bij vroegtijdig ingetreden stoornis der neusademhaling niet normaal tot stand komt. De vermeerderde trekking van het middenrif bij den ademnood, gedurende den nacht, veroorzaakt een intrekking der voorste en onderste deelen der borstkas, die vooral *niet* met rhachitische borstkas-veranderingen (pectus carinatum, rozenkrans) verwisseld mag worden. De photo laat geen twijfel, dat inderdaad de tetraëdrische vorm is bedoeld.

Verder beschrijft KÖRNER nog als gevolg van de mondademhaling veranderingen aan de bovenkaak, waarvan de voornaamste is, dat het verhemelte hoog en smal wordt.

In gevallen waar de tetraëdrische thorax het gevolg is van adenoïde vegetaties (een mogelijkheid, waarop ook prof. DE BRUIJN wees), is het dus wel aardig ook op de bovenkaak te letten.

Zelf zag ik één geval van tetraëdische borstkas bij een jongmensch van 18 jaar, die tot zijn derden jaar aan bronchitis met erge benauwdheden had geleden. Zijn verhemelte was wel wat hoog, maar niet bijzonder smal.

Delft, 16 Mei 1920.

L. J. VISSER.