

INGEZONDEN.

CONGRES VOOR OPENBARE GEZONDHEID.

De "Royal Institute of Public Health" houdt dit jaar zijn congres te *Gent*, op verzoek van het Stadsbestuur en zijn academischen Raad; uit Brussel klinkt de oproep bij monde van dr. ROELS, Medisch-Inspecteur van den Arbeid en Secretaris voor de industrie-hygiënische sectie.

Hoor, hoe hij het zegt: „Wij verhoppen ook van onze Nederlandsche collega's eene belangrijke medewerking. Onnoodig te zeggen, dat u op de gulhartigste wijze door ons zult ontvangen worden”.

Mijne persoonlijke bekendheid met ROELS uit de dagen van de industrie-hygiënische studiereis in 1925 stelt mij in staat deze woorden als welgemeend te waardeeren.

Alzoo Pinksteren 1927. En het programma? 5 secties van beteekenis:

Section I. „State Medicine and Municipal Hygiene”.

Section II. „Naval, Military, Air and Tropical Diseases”.

Section III. „Industrial Hygiene”.

Section IV. „Pathology, Bacteriology and Bio-Chemistry”.

Section VI „Women and the Public Health”.

Elck wat wils.

En tot slot: „de Duitsche collega's zullen ruim vertegenwoordigd zijn”.

Gent 1927.

W. R. H. KRANENBURG.

DE BEHANDELING VAN DEN ASTHMA-AANVAL MET EPHEDRINE.

In den laatsten tijd wordt van Duitsche zijde ephedrine aanbevolen als een middel om asthma-aanvallen te bekorten (v. HEISZ, KÄMMERER en DORRES, JANSEN e.a. 1). Zoowel bij experimenteel opgewekte asthma-aanvallen bij dieren (KREITMAR), als bij menschen lijdende aan asthma bronchiale, wordt een voortreffelijke werking beschreven.

Ik paste het middel bij eenige patiënten met asthma bronchiale toe, met zeer goed gevolg. Bij het begin van den aanval geeft men 1 tablet van 50 mgr. hydrochlor en ephedrini (MERCK). Men ziet dan na 15 à 20 minuten vrij plotseling de benauwdheid verdwijnen, geheel als na een adrenaline injectie. Schadelijke of onaangename bijwerkingen heb ik niet waargenomen. Patiënten met hevige langdurige aanvallen die hen anders eenige dagen volslagen hulpeloos maakten, konden, met 's morgens en 's avonds 50 mgr. ephedrine, zonder veel last blijven doorwerken.

De werking van het ephedrine is in hoofdzaak gelijk aan die van adrenaline, maar het nieuwe middel heeft twee voordeelen, die voor de toepassing in de practijk van zeer veel belang zijn. De werking van ephedrine houdt n.l. veel langer aan dan van adrenaline en bovendien is het ook werkzaam bij inwendig gebruik. Dit laatste vooral is van zeer veel belang, in het bijzonder in de buiten-practijk met groote afstanden, waar het halen van den dokter voor een adrenaline,- of asthmolysine injectie (die dan vaak nog maar zeer kort verlichting brengt) soms een heele onderneming is, waartoe men pas in uiterste noodzaak overgaat.

Daar de tabletten, toen ik ze voor het eerst bestelde, nog niet in Nederland verkrijgbaar waren, vermoed ik, dat het middel in ons land nog zeer weinig wordt gebruikt, waarom ik er hier nog eens de aandacht op vestig en verdere proefneming aanbeveel.

Den Burg, Texel.

J. R. PRAKKEN.

1) Zie o. a. referaat *Ned. Tijdschr. voor Geneesk.*, 20 November 1926.