

INGEZONDEN.

EEN BEPAALDE TONGAFWIJKING BIJ LIJDERS AAN MAAGZWEER.

In aansluiting aan het referaat van collega POSTHUMA (*Ned. T. v. G.*, 16, bldz. 1851, 1932) kan ik mededeelen, dat ik een dergelijke tongaandoening als beschreven, heb waargenomen bij iemand, die geen enkel ander verschijnsel van een maagziekte vertoonde. Deze 27-jarige dame had op haar tong epitheeldefecten, zooals vermeld zijn. Naar het beloop heb ik dit beschouwd als een verschijnsel, dat samenhang met de op handen zijnde menses. Toen de menstruatie begonnen was, genas de tong. — Kan men het causale verband aangeven?

Amsterdam, 17 April 1932.

S. A. PRINS.

ZICH UITBREIDENDE, GANGRAENEUSE ULCERATIE VAN DEN BUIKWAND.

Het lijkt mij waarschijnlijk, dat ik niet de eenige was, wien het „l'histoire se répète” voor den geest kwam na het lezen van het artikel van prof. CAROL over een zich uitbreidende gangraeneuse ulceratie van den buikwand na operatie 1). De voorgeschiedenis en de ontwikkeling van de antiseptische chirurgie 2) maken het wel duidelijk, dat hier het beruchte hospitaalgangraen beschreven wordt. Velen zullen gemeend hebben, dat dit gangraen tot de uitgestorven ziekten behoorde. Ik was er vast van overtuigd. En wij moeten prof. CAROL dankbaar zijn, dat hij op de herleving van deze eens met alle kracht uitgebannen kwaal de aandacht vestigt. Uit het genoemde artikel komt duidelijk de algemeene opinie omtrent het ontstaan van het hospitaalgangraen nog eens naar voren: dat dit slechts mogelijk is door een massale samenwerking van verscheiden bacteriesoorten. „Prévenir vaut mieux que guérir”, moge allen, die belang hebben bij de waarschuwing van prof. CAROL, dit indachtig zijn.

Kerkrade 19 April 1932.

B. VERAART.

BERICHTEN.

BUITENLAND.

CHINA. — **Bestrijding der pest.** Twintig jaren geleden werd de Mandsjoerische praeventieve pestdienst ingesteld, ter bestrijding van de pest onder de pelsjagers, die vallen zetten voor tarahagans, onder welke knaagdieren voortdurend pest heerschte. De uitslag van het werk heeft de verwachtingen verre overtroffen, en behalve een beperkte epidemie in 1920—1921 zijn er slechts nu en dan ziektegevallen in Mandsjoerije voorgekomen. De gretige jacht op de dieren heeft hun aantal ook sterk doen verminderen. Maar nu heeft zich een pesthaard in het veel dichter bevolkte Zuid-Westen van Mandsjoerije gevormd, en de dieren, waaronder de ziekte heerscht, zijn thans de ratten. De menschenpest is nu grootendeels builenpest.

In *The Brit. med. Journ.* van 10 April wordt de vrees geuit, dat de oorlogstoestand aan de krachtige bestrijding der pest, waaraan ook de Chineesche leeken-ambtenaren zoo ijverig aandeel hebben genomen, groote schade zal toebrengen. Reeds is een ziekenhuis met zijn geheele wetenschappelijke uitrusting door de troepen uitgeplunderd.

1) *Ned. Tijdschrift voor Geneesk.* 16 April 1932, bldz. 1836.

2) Zie o.a. Sir RICHMAN J GODLEE „*Lord Lister*” bldz. 144.

LORD LISTER Collected Papers” Vol. II, bldz. 341.