

INGEZONDEN.

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen.

LARYNXSTENOSE EN STENOSEWEER.

In de mededeeling van dr. KRAMER over Larynxstenose en stenoseweer (dit *Tijdschrift* No. 32, 1932), meen ik te moeten lezen, dat het stellen van een laryngologische diagnose bij kinderen eigenlijk niet mogelijk is.

Dit is gelukkig niet het geval. Met iederen directen laryngoscoop, maar vooral met den directen kinderlaryngoscoop volgens JACKSON, is het stellen van een laryngoscopische diagnose bij kinderen even eenvoudig, zoo niet eenvoudiger, als bij volwassenen. Gedurende de 11 jaren dat ik dit instrument bezit, heeft het mij bij de differentiatie tusschen pseudo-croup en diphtheritische vernauwing altijd goede diensten bewezen. Het instrument is zoo eenvoudig in zijn toepassing, dat het misschien ook in handen van laryngologisch ongeschoolden goede diensten kan bewijzen.

Dordrecht,
8 Augustus 1932.

W. J. ASSIES,
neus- keel- en oorarts.

BERICHTEN.

BUITENLAND.

WIESBADEN. — De „*Naturforscherversammlung*”. De 92ste vergadering van Duitsche natuuronderzoekers en artsen zal dit jaar, van 25 tot 29 September, in twee steden bijeenkomen. De artsen komen te Wiesbaden, de natuuronderzoekers te Mainz. De algemeene vergaderingen worden te Mainz gehouden, en eenige redevoeringen in de openingszitting zullen aan den Rijn als natuurverschijnsel, de beteekenis van den Rijn voor de anthropologie en „prae-historie” en de oeconomische beteekenis van den Rijn gewijd zijn, omdat de landen aan den Rijn weder vrij zijn (*Deutsche med. Wochenschr.*, 30 Juli).

HAMBURG. — **Arsenikvergiftiging door wijn.** Voor eenigen tijd werd in de pers melding gemaakt van vergiftigingsverschijnselen bij de bemanning van een Fransch koopvaardijship, veroorzaakt door het drinken van wijn, die arsenik bleek te bevatten. Twee mannen waren gestorven. In de *Deutsche med. Wochenschr.* beschrijft MÜHLENS zes dergelijke gevallen, waargenomen in het instituut voor scheeps- en tropenziekten te Hamburg. De zes patiënten hadden deel uitgemaakt van een Fransche bemanning van 32 koppen. Alle opvarenden waren ziek geworden, met alle verschijnselen van arsenikvergiftiging. De mannen hadden dagelijks een liter rooden wijn gedronken, uit Spanje afkomstig, en per liter was 3—12 mgr. arsenik gevonden. Het arsenik kan afkomstig zijn van besproeiing van de wijnstokken met oplossingen van kopersulfaat met bijmengselen van arsenik, of van toevoeging aan den wijn van suiker, die arsenik bevatte.

.. In 1888 zijn te Toulon 500 dergelijke ziektegevallen voorgekomen met 15 dooden, en in 1901 te Liverpool 6000 gevallen met 70 dooden.

JAPAN. — **Onderzoek naar de erfelijkheid der melaatschheid.** In het leprasanatorium op Oshima zullen de kinderen, uit melaatsche ouders geboren, worden geïsoleerd en worden geplaatst onder de hoede van verpleegsters, die niet in de kolonie werkzaam zijn geweest, ten einde na te gaan, of deze kinderen nu vrij blijven van de ziekte, of dat deze misschien wordt overgeërfd (*Journ. Am. med. Ass.*, 23 Juli).

NEW-YORK. — **Trichines in berenvleesch.** Een gezelschap jagers had een beer geschoten, en het vleesch daarvan gegeten, nadat het aan de bewerking was onderworpen, die men „jerking” noemt: het wordt in dunne reepen gesneden, gerookt en dan in de zon gedroogd. De jagers waren allen ziek geworden,