

INGEZONDEN.

De redactie behoudt zich voor ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken zoo noodig eenige bekorting aan te brengen.

HABITUEELE ABORTUS.

Naar aanleiding van het artikeltje, in dit *Tijdschrift* dd. 20 Maart, van collega J. P. ASJES over een geval van habitueelen abortus, wil ik nog van een tweetal gevallen melding maken:

1. Ruim 2 jaar geleden kwam een goed gebouwde, jonge vrouw op mijn spreekuur, die reeds vijf maal een abortus had gehad, terwijl zij eens na 7 maanden van een tweeling bevallen was, die na korten tijd was overleden.

Bij onderzoek was niets te vinden aan genitalia, nieren en andere organen. Ik heb de vrouw toen behandeld eveneens met injecties van progestine 1 cM³ per keer om den anderen dag. Ik liet haar verder veel sinaasappelen eten en gaf den drank van CHARCOT voor haar nervositeit. Dit deed ik van het oogenblik af, dat de zwangerschap 1½ maand oud was tot 4 maanden toe. Daarna liet ik de vrouw nog veel rust nemen en na 9 maanden beviel ze vlot van een jongen met een gewicht van 8 pond.

2. Het tweede geval betrof een vrouw, die een abortus had en bij haar tweede zwangerschap een ziekelijken angst kreeg voor herhaling. Ik gaf ook toen progestine en met succes.

Genemuiden, 9 April 1937.

P. PROVÓKLUIT.

INVERSIO UTERI PARTIALIS.

Het vorige jaar zag ik een gedeeltelijke inversio uteri post partum, veroorzaakt door een uteruspoliep, die ingeklemd was in het gecontraheerde ostium uteri, juist zooals een knoop in een knoopsgat, en zodoende haar insertieplaats had meegetrokken. Er was een flinke fluxus. Daar er periculum in mora was door het groote bloedverlies en een transport naar het gasthuis, op anderhalf uur afstand gelegen, mij onverantwoordelijk toescheen, heb ik de vrouw, na mij talis qualis te hebben gedesinfecteerd, onderzocht en tevens de poliep uit haar beklemming bevrijd, die daarna als het ware terugveerde. Na tamponnade van den uterus en het geven van een hypodermoclyse van zout-wateroplossing — aqua destillata had ik niet bij de hand — herstelde de vrouw. Puerperium ongestoord. Enkele maanden later werd de poliep door den gynaecoloog dr. VAN ERP verwijderd.

Veghel, 10 April 1937.

J. VERBEEK.

INVERSIO UTERI PARTIALIS.

Ongetwijfeld heeft dr. ELSHOVE gelijk, wanneer hij zegt, dat de mededeeling van een inversio uteri partialis gerechtvaardigd is door de zeldzaamheid van het geval.

Als „les” voor de aanwijzingen en tegenaanwijzingen lijkt me zijn mededeeling (N. T. v. G. 81. I. 13) echter minder geslaagd.

Laat ons aannemen, dat het „stevig op den uterus drukken” der vroedvrouw hetzelfde is als de handgreep van CREDÉ (zooals dr. ELSHOVE doet). „En dit reeds een kwartier na de bevalling?” dan denken we terstond, dat er toch wel iets bijzonders zal geweest zijn. Inderdaad, patiënte „vloeiëde iets”. Dit nu is de eerste fout tegen verloskundige regels. „Iets vloeien” is hier physiologisch en dus geen indicatie tot handelen. Laat ons echter een oogenblik aannemen, dat dit „iets vloeien” zeer verontrustend is geweest, dan was er wél een indicatie ontstaan tot zoo vlug mogelijke verwijdering der placenta (respectievelijk blaas ledigen, intraveneus orasthine,