

## INGEZONDEN.

*De redactie behoudt zich voor ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken zoo noodig eenige bekorting aan te brengen.*

### MAAGKANKER, ALCOHOL EN TABAK.

Heden ontving ik van den consul-generaal der Nederlanden te Kopenhagen een exemplaar van het geneeskundig rapport voor het Koninkrijk Denemarken in 1935 met een begeleidend schrijven van dr. KREBS, directeur van de Röntgencliniëk in Aarhus.

Hieruit blijkt, dat Denemarken wel, evenals Nederland en Engeland, over een afzonderlijke statistiek van de sterfte aan kanker van de maag beschikt. Deze is als volgt:

|           | M   | V   | Per 10000 inwoners |     |
|-----------|-----|-----|--------------------|-----|
|           |     |     | M.                 | V.  |
| 1921—1925 | 904 | 806 |                    |     |
| 1926—1930 | 971 | 828 |                    |     |
| 1931—1935 | 954 | 836 | 5.59               | 4.6 |
| 1935      | 953 | 792 |                    |     |

Het cijfer per 10000 is berekend op de bevolking van 1930 volgens de laatste volkstelling. Hieruit blijkt, dat de sterfte aan maagkanker in Denemarken grooter is dan in Nederland en nog *vél hooger* dan in Engeland. Het alcoholgebruik is — hoewel hooger dan in Nederland — *lager* dan in Engeland. Het totale alcoholgebruik in Denemarken is zooals uit de tabel bleek (blz. 2716. II. No. 24) lager dan in vele op de tabel voorkomende landen met uitzondering van Nederland.

Rotterdam, 17 Juni 1937.

F. A. SCHALIJ.

## BERICHTEN.

### BUITENLAND.

**BOEDAPEST. — Grondbezit en vruchtbaarheid.** In een brief uit Boedapest in *The Lancet* van 12 Juni wordt o.a. medegedeeld, dat in Hongarije de bezitters of pachters van stukken grond, grooter dan 40 H.A., gemiddeld 3.38 kinderen hebben; de bezitters of pachters van kleinere stukken grond gemiddeld 3.75, en de landarbeiders gemiddeld 4.2 kinderen.

**NEW YORK. — Voorlichting door de dagbladers.** Ook ons *Tijdschrift* geniet van tijd tot tijd de eer, door een dagblad te worden „aangehaald.” Maar de aanhaligheid, die het *S. Afr. Med. Journ.* (22 Mei) heeft ontdekt in het New Yorksche blad *Time*, overtreft al wat op dit gebied reeds is ondervonden. *Delirium tremens* luidt het opschrift. Na een werkelijk pakkende beschrijving van den aanval dezer ziekte vervolgt het blad: „De vorige week heeft *The Journ. of the Am. med. Association* aan de 26 methodes om D.T. te behandelen, nog eene toegevoegd, welke de ontwerpers, drs. PIKER en dr. COHN, aanbieden als eenvoudig en doeltreffend. Slechts 5.3 pCt. van hun lijders zijn gestorven, tegen een gemiddelde sterfte van 10—12 pCt., of ook wel eens 37 pCt. Zij doen hun patiënten nooit een dwangbuis aan, binden hen alleen als er niet genoeg krachtige zusters zijn om hen te kalmeeren. Zij kalmeeren hun lijders met paraldehyde. Zelden geven zij barbituraten (gelijk allonal), omdat deze zelden een dronken man kalmeeren