

DE LUMBALE PUNCTIE ALS THERAPEUTICUM EN DE „FORCED DRAINAGE”.

Bij de opsomming van de therapeutische mogelijkheden van de lumbale punctie, o.a. ook bij meningitis, noemt collega BIEMOND de „forced drainage” van KUBIE en zegt hierbij, niet te weten of deze methode ook aan het ziekbed toegepast is geworden.

In *Arch. Neurol. and Psychiat.*, deel 33, 1935, blz. 205 e.v. staat een uitvoerig verslag van een vergadering van de *New York Neur. Soc.* geheel gewijd aan dit onderwerp.

Men spuit intraveneus in van 250 tot 300 cM³ zoutoplossing van 0.45 tot 0.5 pCt. en doet dit in een tijdsverloop van 20 minuten tot 3¹/₂ uur. Men tapt dan, met de lumbale punctie, van 50 tot 165 cM³ liquor af.

Soms combineerde men het, met nog eens 2000 cM³ te laten drinken in denzelfden tijd.

Hoewel de waardeering in de discussie niet onverdeeld was, leek het mij juist te wijzen op een methode, die in een bepaald geval zeker haar waarde kan hebben. Middelburg, Augustus 1937.

W. W. DE REGT.

BRIEFWISSELING.

Gedurende de maand Augustus zullen prof. dr. G. VAN RIJNBEEK en mej. dr. E. SLUITER afwezig zijn.

REDACTIE.

BERICHTEN.

BUITENLAND.

NIEUW-ZEELAND. — Sterfte door afdrijving. *The Lancet* van 17 Juli geeft een uittreksel van een rapport over het abortusvraagstuk in Nieuw-Zeeland. Terwijl de algemeene gezondheidstoestand goed is, en de sterfte in het algemeen en de kindersterfte zeer laag, neemt de moedersterfte toe. Hierbij hebben de lijnen, die de sterfte aan sepsis in het kraambed en die aan septischen abortus voorstellen, elkander reeds in 1930 gekruist — toen waren evenveel vrouwen door beide oorzaken bezweken. En in de jaren 1931—1935 zijn 176 vrouwen door septischen abortus om het leven gekomen, en 70 door sepsis in het kraambed. Het rapport schat het aantal afgebroken zwangerschappen op 20 pCt. van het geheel; en hiervan zijn 2/3 moedwillig afgebroken. In Engeland — zegt *The Lancet* — zal het ongeveer evenzoo zijn gesteld; van 3000 zwangere vrouwen, die een gynaecologische inrichting te Birmingham hadden bezocht, hadden 21 pCt. miskramen, volgens een rapport van het Britsche ministerie van gezondheid. (De Nieuw-Zeelandsche cijfers intusschen hebben betrekking op de geheele bevolking.) Het falen van „voorbehoedmiddelen” wordt als de voornaamste aanleiding van het verschijnsel beschouwd. Het rapport wenscht den verkoop of de u'treiking van deze middelen beperkt te zien tot bevoegde apothekers, artsen, ziekenhuizen en polycliniken. Onbevoegden verkoop wenscht het streng gestraft te zien, evenals het adverteeren en verkoopen van middelen „tot herstel van vrouwenkwalen” of van „onregelmatigheden”. Deze middelen zijn gebleken, of zonder werking te zijn, of schadelijk. De winst, ermede behaald, bedroeg ten minste 900 pCt.. Ook werd aanbevolen het verbod van verkoop (buiten voorschrift van den arts) van instrumenten zooals catheters, bougies, laminaria (sea-tangle-)stiften, en zoo voort. En verder „opvoeding” van het publiek, ter bestrijding van den „zelfmoord van het ras”.

In dit verband is merkwaardig, wat dr. RAWLINS CADIVALLADER mededeelt in *The Journ. of the Am. med. Association* van 10 Juli. Hij heeft kunnen nagaan,