

Ook *griep*-patiënten worden reeds met prontosil behandeld, zoo ook de gewone genuïne *pneumonie*. Het heeft mij en anderen getroffen, dat merkwaardig dikwijls de diagnose „sepsis” wordt gesteld, en dat het prontosil dan prompte genezing teweeg brengt. Onlangs werd mij voorgesteld, bij een acute thrombophlebitis het middel toe te passen. Ik ontried dit, en toch genas de patiënt in 14 dagen.

Iedere chirurg zou bijdragen kunnen leveren voor dit onderwerp. In gevallen van *ontwifelbare* bloedbesmetting zag ik ondanks toediening van prontosil patiënten sterven. Ook in de Deutsche chirurgische literatuur wordt reeds van zulke teleurstellingen melding gemaakt, als er werkelijk een algemeene bloedbesmetting bestond, maar tevens wordt terecht er op aangedrongen, niet al te vrijgevig te zijn met deze diagnose, en de toxaemie niet te verwarren met de bacteriaemie.

Hilversum, 13 December 1937.

D. E. SCHOUTEN.

In een aflevering van de *Geneesk. Bladen*, geheel gewijd aan de behandeling van infectie der *urinewegen*, worden alle tot nog toe gebruikte middelen verworpen en het prontosil aangeprezen. Wij weten intusschen, dat dit gevaarlijk kan zijn, zelfs voor het leven.

Nu heeft het mij getroffen, dat ik in de *Geneesk. Bladen* niet als geneesmiddel bij pyelitis en pyelo-cystitis heb aangetroffen *chloras kalicus*. Dit schijnt obsoleet te zijn, maar ik kan uit lange ervaring verzekeren, dat het deugdelijk is, in den vorm van 10 G. op 300 G. water, 5 maal daags één lepel, nooit meer dan twee drankjes achtereen, maar meestal is één drankje voldoende. Prof. STOKVIS noemt en roemt het *chloras kalicus* als diureticum. Laat men het eens beproeven.

Leeuwarden, 12 December 1937.

H. DE JONG.

Hoewel ik volkomen instem met de waarschuwing tegen het gebruik van prontosil buiten strenge indicatie, moet ik toch opmerken, dat inwendig gebruik van *chloras kalicus* geenszins onbedenklijk is, in het bijzonder bij aandoeningen der *urinewegen*. Het prikkelt immers de nieren en kan methaemoglobinurie, haematurie en ten slotte anurie teweeg brengen. Van de tabletten (met 100 mG.), die wel worden geslikt bij keelpijn, bevelen wij aan, er slechts drie per dag te gebruiken, en een lepel van het hierboven genoemde drankje bevat 0,5 gram!

Onlangs heb ik bij een patiënt prontosiltabletten aangetroffen, die hij op eigen gezag gebruikte bij een lichte angina, omdat deze tabletten hem elders bij een vorige gelegenheid door een arts waren aanbevolen.

H. PINKHOF.

BERICHTEN.

Wetten, besluiten, enz.

Het wetsontwerp tot verlenging van den geldigheidsduur der tijdelijke bepalingen betreffende de vaccinatie. — De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp, om den geldigheidsduur der tijdelijke bepalingen wederom met 2 jaar te verlengen, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Het amendement van mevrouw DE VRIES—BRUINS, de wet niet tot 1940, doch tot 1939 te verlengen, werd met 49 tegen 30 stemmen verworpen. Minister ROMME had dit amendement ontraden, daar hij den tijd dan te krap achtte.

Mr. C^A. M. SCHENCK.

BUITENLAND.

GENÈVE. — De internationale contrôle op den handel in **narcotica**. De Volkenbond heeft weder verslag uitgebracht over den handel in opium en verwante stoffen. De strengere straffen, in sommige landen op het onwettig bezit van zulke stoffen gesteld (in Canada bij voorbeeld ten minste