

INGEZONDEN.

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen.

KAS VOOR BUITENGEWONE GENEESMIDDELEN.

Op de laatste samenkomst in Oss vestigde prof. DEN HOED, Leuven, de aandacht op de gunstige resultaten bereikt bij de behandeling van crausosis vulvae met groote doses Menformon. Weder een ziekte, die een hormoontherapie schijnt te eischen. Voor zoover ik weet zijn deze onderzoekingen in Nederland nog niet nader onderzocht en blijft er dus reden tot twijfel bestaan. Er is echter, gezien de dikwijls treurige prognose, alle reden een therapeutische poging in dezen zin te wagen. De vraag doet zich echter voor, hoe moeten ziekenfondsen en kleine particulieren zich instellen tegenover de kostbare behandeling met menformon, cortine, gonadotrope extracten, progestine en zoo voort. Al te vaak zijn voor velen de kosten een beletsel om de juiste geneeswijze toe te passen. Ik doe daarom het voorstel een fonds te vormen, waaraan ieder die wil, mede kan werken, ten einde aan onvermogen en minder vermogen hormoonbehoevenden de noodige hulp te verstrekken. Degenen die den laatsten cursus in Oss hebben meegemaakt zullen mijns inziens gaarne hun medewerking verlenen.

A. KEESING.

Het zou te hopen zijn, dat een fonds, gelijk KEESING bedoelt, tot stand komt. Een moeilijkheid zou blijven de voorziening voor patiënten in „doktersfondsen” op het land.

Hierin zou kunnen worden voorzien, als *alle* ziekenfondsen, ook de doktersfondsen, een klein bedrag per honderd leden zouden storten in een te vormen „kas voor buitengewone geneesmiddelen”.

H. PINKHOF.

LEVER-EXTRACT EN THROMBOSE.

In het *Ned. Tijdschr. v. Geneesk.* van 23 Juli 1938 refereert ENGELHARD over een methode tot voorkoming van thrombose door inspuiting van een lever-extract, i.c. campolon.

Daartoe welwillend door „Organon” in staat gesteld, beproefden wij dit reeds 2 $\frac{1}{2}$ jaar geleden. Patiënten, opgenomen voor herniotomie of appendicectomie-à-froid, werden om-en-om ingespoten. Daags vóór de operatie 2 cM³ pernaemon forte, op den 3den en 7den dag nogmaals 2 cM³ pernaemon.

Wij zagen geen verschil: dezelfde lichte temperatuursverhoogingen; dezelfde lichte pleurapijn bij enkele patiënten van de beide groepen, zonder dat wij de diagnose embolie zeker konden stellen. Maar wij zijn opgehouden, toen één der met pernaemon behandelde patiënten een thrombose kreeg en deze aan de injectie toeschreef.

Ik geloof niet, dat anderen de besproeving van deze methode kan worden aangeraden.

M. N. ROEGHOLT.

ERMETRINE DURANTE PARTU.

Naar aanleiding van de gedachtenwisseling over ermetrine durante partu wensch ik de volgende waarneming mede te deelen.

Sedert eenige maanden heb ik geregeld na de uitdrijving der placenta 1 cM³ ermetrine intramusculair gegeven en was daar in ongeveer 10 gevallen zeer over tevreden; de nabloedingen waren uiterst gering, ook bij vrouwen, die bij vorige baringen nog veel bloed post partum verloren hadden.

Op 28 Juli werd ik bij een II-para geroepen. Het is een bleeke, slappe vrouw, die na de geboorte van haar eerste kind flink gevloeid had. Naar aanleiding van de