

INGEZONDEN.

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen.

RIJKS-INSTITUUT VOOR DE VOLKSGEZONDHEID.

Afd. Serologie.

Halfjaarlijksch onderzoek der op 1 April 1940 in omloop zijnde antitoxische sera.

Aard van het serum	Serie-letter en nummer	Aanvangsterkte in AE per cm^3 ten minste	Sterkte op 1 April 1940 in AE per cm^3	Onderzoek op steriliteit	Opmerkingen
Serum antidiphthericum equinum	A 34	300	300	Steriel	Voldoeta/deischen
	A 34	300	300	"	"
	A 36	300	300	"	"
	B 21	600	600	"	"
	B 22	600	600	"	"
	B 23	600	600	"	"
Idem gezuiverd	K 14	600	600	"	"
	K 15	600	600	"	"
	K 16	600	600	"	"
Serum antidiphthericum ovinum	C 17	100	100	"	"
Idem gezuiverd	O 5	200	200	"	"
	O 6	200	200	"	"
Serum antitetanicum equinum	D 28	250	250	"	"
	D 29	250	250	"	"
	D 30	250	250	"	"
	E 20	500	500	"	"
	F 5	750	750	"	"
Idem gezuiverd	T ₁ 10	500	500	"	"
	T ₁ 11	500	500	"	"
	T ₂ 5	1000	1000	"	"
	T ₂ 6	1000	1000	"	"
Serum antitetanicum bovinum	R ₂	250	250	"	"

Utrecht, 10 April 1940.

De Directeur van het Rijks-Instituut voor de Volksgezondheid,

W. AEG. TIMMERMAN.

„SCHLAMMFIEBER”.

Naar aanleiding van het korte referaat van het artikel van KATHE over „Schlammfieber” (modderkoorts) (dit *Tijdschrift*, blz. 1838, No. 14, 1940), wil ik het volgende als een aanvulling vermelden.

Op het Instituut voor Tropische Hygiëne te Amsterdam worden de cultures van de leptospira van Schlammfieber sinds 1926 aangehouden. Wij kregen deze cultures uit Moskou, waar het het eerst gelukte, de leptospira uit het bloed van zieken te kweken, nadat reeds een jaar tevoren door PRAUSNITZ (Silezië) de parasiet in het bloed gezien en gefotografeerd was. Nadat men er toen in 1937 ook in Beieren in geslaagd was (SCHLOSSBERGER c.s.) de *L. grippotyphosa* (voor dezen monstrueuse naam is TARRASOFF verantwoordelijk !) tijdens de zomer-epidemie te kweken, is onze verzameling ook met de Beiersche stammen verrijkt.