

werd chemisch bilirubine aangetoond, terwijl de witte gedeelten bij chemisch onderzoek uit cholesterine bleken te bestaan.

Limmen, N.H. 2 Juni 1940.

M. J. F. VAN OPPEN.

BRIEFWISSELING.

Op verzoek van den Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, dr. C. BANNING, vestigen wij de aandacht op de toezending aan alle artsen van de twee circulaire betreffende: Aangifte van besmettelijke ziekten, en Bestrijding van geslachtsziekten. Daar de inhoud dezer circulaire van groot belang te achten is, worden de collegae, die de circulaire niet hebben ontvangen, verzocht zich te wenden tot dr. BANNING, Mauritskade 55, den Haag, voor een duplicaat.

REDACTIE.

BERICHTEN.

Wetten, besluiten, enz.

Geneesmiddelenbeschikking No. 1. — Het departement van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat alsnog als contraststoffen voor de röntgen-diagnostiek, als bedoeld in tabel *a* van de geneesmiddelenbeschikking 1939, no. 1, zullen worden beschouwd: jodeikon en radiotetrane (N.R.Ct.).

Mr. C^A. M. SCHENCK.

BINNENLAND.

Jaarverslag 1939 van het Centraal Genootschap voor kindherstellingsoorden en vacatiekolonies. — Het verslag maakt melding van de moeilijkheden, veroorzaakt door de mobilisatie: op 9 September werd in een spoedvergadering der verplegende vereenigingen besloten, de verpleging, zij het met de noodige voorzichtigheid, voort te zetten. Op 10 November werden op last van den minister van defensie alle koloniehuzen ontruimd; begin December kon echter weer op beperkte schaal met de verpleging worden begonnen. Doordat ruim 31000 verpleegdagen aldus verloren gingen werd een belangrijk financieel verlies geleden. Met de verstrekking van levensmiddelen aan de koloniehuzen werden geen moeilijkheden ondervonden.

Het percentage der ouders, die niet in staat zijn eenige geldelijke bijdrage te verlenen, daalde van 72 tot 67. In het verslagjaar werden verpleegd 7394 kinderen met 280719 verpleegdagen; hierbij waren 427 kinderen met B-verpleging en ruim 38000 verpleegdagen.

Van besmettelijke ziekten kwam typhus eenmaal voor bij een schipperskind, dat thuis besmet was; 8 kinderen hadden scabies bij aankomst. Diphtherie werd vastgesteld bij één geleidster en bij 7 kinderen, die geëvacueerd werden, evenals 2 bacillendragers. Er werd overgegaan tot immunisatie van alle kinderen en personeel tegen diphtherie en de opneming werd gestaakt; door deze maatregelen zijn geen nieuwe gevallen meer voorgekomen. In één groep kwamen 28 gevallen van roodvonk voor, in andere koloniehuzen kwamen nog 7 sporadische gevallen voor, voorts enkele gevallen van mazelen, kinkhoest, bof, waterpokken, roode hond, besmettelijke icterus. Besmettelijke tuberculose kwam niet voor.

Het aantal schildkliervergrootingen steeg wederom en bedroeg bij de meisjes 39 pCt., bij de jongens 28.5 pCt. Carieuse kiezen of tanden werden bij 60 pCt. van alle kinderen bij oppervlakkige inspectie gevonden. Het aantal onvoldoend verbeterde kinderen nam toe van 18.7 pCt. tot ruim 21 pCt., het aantal meer dan voldoende verbeterden daalde van 24.2 pCt. tot 21.6 pCt.. Deze cijfers zijn in hoofdzaak te wijten aan de steeds minder goed wordende resultaten der zomer-