

INGEZONDEN.

De Redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen.

VOORSCHRIFTEN VOOR GENEESMIDDELEN.

Op verzoek van den Voorzitter van den Gezondheidsraad, dr. L. C. KERSBERGEN, vestigen wij de aandacht van alle artsen op de „Voorschriften voor geneesmiddelen”; samengesteld door een deskundige commissie uit den Gezondheidsraad en te beschouwen als een noodformularium voor deze tijden, waarin vele geneesmiddelen zullen gaan ontbreken of duur zullen worden.

Bijgevoegd is een motiveering voor de samenstelling en een vlugschriftje over de bestrijding van kleerluizen. Den artsen wordt ten sterkste aanbevolen, van deze toezending nota te nemen.

REDACTIE.

ACTIVEERING VAN LATENTE TUBERCULOSE NA TYPHUS-VACCINATIE.

A., vrouw, 19 jaar, komt uit een gezin, waar tuberculose heerscht. Een broer en een zuster zijn aan tuberculose van de longen overleden. Een zuster heeft pleuritis tuberculosa gehad. Sinds 13 November 1933 is zij onder contrôle van het Consultatiebureau te Schiedam. Tuberculeuse afwijkingen heeft zij in dien tijd nooit gehad. Op 30 Mei 1940 wordt zij tegen typhus ingeënt. Na de inspuiting heeft zij alleen een wat stijf gevoel in den rug gedurende den dag na de inspuiting. Op 3 Juni 1940 bezoekt zij het Consultatiebureau voor periodieke contrôle; zij heeft dan geen klachten en geen afwijkingen.

Op 7 Juni 1940 bezoekt zij haar huisarts, dr. A. VAN DER GRIEND, omdat zij vlekken heeft op de beide onderbeenen. Twee dagen later heeft zij ook last van de oogen. De huisarts stelt erythema nodosum vast op de beide onderbeenen en conjunctivitis phlyctaenulosa op beide oogen.

De bloedbezinkingssnelheid is 23 mM. na 1 uur en 54 mM. na 2 uur. Op verzoek van den huisarts komt zij 10 Juni 1940 opnieuw op het Consultatiebureau, waar bovengenoemde afwijkingen bevestigd worden. De X-photo van de longen toont geen afwijkingen aan, de bloedbezinkingssnelheid is 29—63 mM. Zoowel het erythema nodosum als de conjunctivitis phlyctaenulosa worden waarschijnlijk veroorzaakt door haematogene verspreiding van tuberkelbacillen. Deze beide ziektebeelden ontstonden bij onze patiënte respectievelijk 7 en 9 dagen na de eerste inspuiting met typhusvaccin.

Het is zeer wel mogelijk, dat de typhus-vaccinatie de oorzaak is van de activeering van latente tuberculose in dit geval.

Schiedam, 11 Juni 1940.

B. VAN VLIET,

Districts-tuberculose-arts van het District Schiedam van de Provinc. Zuid-Holl. Vereen. tot bestrijding der Tuberculose.

BERICHTEN.

BUITENLAND.

DUITSCHLAND. — **Onrechtmatige verkrijging van verdoovende middelen, ondanks geneeskundig voorschrift.** De *Münch. med. Wochenschr.* van 26 April maakt melding van een door het Reichsgericht bevestigd vonnis, waarbij een morphinist schuldig werd verklaard aan onwettige verkrijging van verdoovende middelen, en waarbij zijn opneming in een verplegingsgesticht werd gelast. De man had zijn recepten niettemin van een arts (die inmiddels is overleden) verkregen. Doch hij had dien arts een verkeerden naam opgegeven