

H. A. DE BOER, adres: Enschede, Oldenzaalschestraat 46, Telefoon 3596 en in den tijdelijken dienstkring Venlo sedert 22 Mei j.l. de controleerend-geneeskundige A. HIDDEMA, p/a Raad van Arbeid te Venlo.

Amsterdam,
29 Mei 1942

Voor het Bestuur der Rijksverzekeringsbank,
De Secretaris-Generaal,
Mr. J. C. HEYNING

BESCHUIT VOOR ZIEKEN

De verstrekking van beschuit aan zieken zal in het vervolg onder de gewone regeling voor de distributie van ziekenvoedsel vallen. De artsen vragen dus in de in aanmerking komende gevallen beschuit aan op het formulier MD 29.

Voor de verstrekking van beschuit komt in aanmerking de groep Maag-darmziekten uit de Regeling van de distributie van ziekenvoedsel, 2de druk, te weten:

ulcus ventriculi en duodeni,
nakuur voor ulcuslijders,
maagdarmstoornis bij zuigelingen,
lever-, galblaas- en pancreasziekten,
spruw en coeliakie.

De betrokken patiënten kunnen per week een hoeveelheid beschuit ontvangen van maximaal 450 gram (6 pak) tegen intrekking van de overeenkomstige hoeveelheid van 600 gram brood.

Een ulcuspatiënt kan dus bij voorbeeld 450 g beschuit krijgen. Hij moet hiervoor 600 g brood afstaan, dat is $\frac{1}{3}$ van de broodkaart; aangezien $\frac{1}{3}$ broodkaart reeds werd ingetrokken, wordt in totaal dus $\frac{2}{3}$ van de broodkaart ingehouden.

's-Gravenhage, 1 Juni 1942

C. BANNING,
*Geneeskundig Hoofdinspecteur
van de Volksgezondheid.*

TWEE GEVALLEN VAN VARKENS-VLEKZIEKTE (ERYSIPELOID)

In het N. T. v. G. van 30 Mei j.l. schrijft collega DE RIJ over „Twee gevallen van varkensvlekziekte (erysipeloid)“.

Bekend is, dat bij varkens een contagieuze ziekte voorkomt, vlekziekte genaamd, welke veroorzaakt wordt door den Bac. Rhusiopathiae suis, een GRAM-positief staafje.

Het meest wordt de milde vorm waargenomen, de zoogenaamde Backsteinblätter-vorm, waarbij het komt tot talrijke, scherp omschreven ontstekingsinfiltraten in de huid, nagenoeg vierkant van vorm en violet-purper van kleur; deze vorm is goedaardig en geneest vaak spontaan zonder seruminjectie.

Daarnaast kennen wij den septichaemischen vorm, welke een veel ernstiger karakter draagt, doch ook van tijdige serumtoediening zeer gunstigen invloed ondervindt.

De derde vorm, welke kan worden waargenomen, is te beschouwen als een rest-vorm van de beide vorige. Hierbij ontwikkelt zich op de hartkleppen een verruqueuse ontsteking, welke door onvolledige compensatie kan leiden tot acuten hartdood. Vaak vindt men deze restverschijnselen toevallig bij sectie.

Met den bac. suipestifer heeft deze aandoening niets uit te staan. Deze ziekteverwekker wordt aangetroffen in het beloop der varkenspest, een aandoening, welke veroorzaakt wordt door een ultravirus, dat van elk der slijmvliezen uit in den bloedstroom dringt, een septichaemisch beeld tevoorschijn roept, gepaard gaande met hooge koorts, hyperaemie en ontsteking der slijmvliezen. Dit virus schijnt een bijzondere voorkeur te bezitten voor een nesteling in het endotheliale weefsel. In dit proces kan o.m. de bac. suipestifer, zoo ook de Bact. enteriditis GÄRTNER en de bac. typhi murium (bac. breslaviense) zich mengen en secundair een bacterieele septichaemie veroorzaken.

Slechts in zeer zeldzame gevallen komt de vlekziekte te zamen met de zoogenaamde varkenspest voor.

Het geval door collega DE RIJ beschreven moet naar mijn meening beschouwd worden als een wondinfectie tengevolge van het binnendringen van vlekziektebacillen.

Deze infectie komt herhaaldelijk bij ons, dierenartsen, als entvlekziekte voor, ver-