

# INGEZONDEN

*De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen*

## RIJKS-INSTITUUT VOOR DE VOLKSGEZONDHEID

### AFD. SEROLOGIE

Halfjaarlijksch onderzoek der op 1 October 1942 in omloop zijnde antitoxische sera.

Aard van het serum	Serie-letter en nummer	Aanvangssterkte in AE per cm <sup>3</sup> minstens	Sterkte op 1 Oct. 1942 in AE p. cm <sup>3</sup> minstens	Onderzoek op steriliteit	Opmerkingen
Serum antidiphthericum equinum .....	A 37	300	300	steriel	voldoet aan de eischen
	A 38	300	300	"	
	A 39	300	300	"	
	B 26	600	600	"	
	B 27	600	600	"	
	B 28	600	600	"	
	B 29	600	600	"	
	B 30	600	600	"	
Idem gezuiverd	K 18	600	600	"	"
	K 19	600	600	"	
	K 20	600	600	"	
	K 21	600	600	"	
	K 22	600	600	"	
	K 23	600	600	"	
Serum antidiphthericum ovinum	C 18	100	100	"	"
	C 19	100	100	"	
Idem gezuiverd	O 7	200	200	"	"
	O 8	200	200	"	
Serum antitetanicum equinum	D 31	250	250	"	"
	D 31a	250	250	"	
	D 32	250	250	"	
	D 33	300	300	"	
	E 21	500	500	"	
	E 22	500	500	"	
Idem gezuiverd	F 5	750	750	"	"
	T <sub>1</sub> 14	600	600	"	
	T <sub>1</sub> 15	600	600	"	
	T <sub>2</sub> 7	1000	1000	"	
Serum antitetanicum bov. ..	T <sub>2</sub> 8	1000	1000	"	"
	R 2	250	250	"	
	R 3	250	250	"	

Utrecht, 10 October 1942

W. AEG. TIMMERMAN,  
Directeur van het Rijks-Instituut  
voor de Volksgezondheid

### CEPHALOHAEMATOMA

De therapeutische raad van prof. ROEGHOLT in zijn klinische les van Zaterdag 10 October in dit *Tijdschrift* aan ons artsen, is zeker onvoldoende. Prof. ROEGHOLT stelt het voor

alsof alle cephalohaematomata terstond na de geboorte worden opgemerkt of althans na het verdwijnen van het caput succedaneum. Dit nu is geenszins het geval. In een groot deel der gevallen verlopen eenige dagen na den partus, voordat men het cephalohaematoma waarneemt. En als dit het geval is, dan moeten wij het haematoom in een breeder verband beschouwen. Het kan dan namelijk een symptoom zijn van de „Hemorrhagic disease of the new-born” van TOWNSEND (morbus haemorrhagicus neonatorum van SALOMONSON). Wij moeten dan zoeken of er nog meer bloedingen bij den zuigeling zijn (tractus digestivus, huid, slijmvliezen, navel en zoo voort). Zijn deze er, dan is de diagnose morbus haemorrhagicus zeker en is het onthouden van vitamine K een kunstfout. Maar ook al vinden wij eenige dagen na de geboorte alleen een cephalohaematoma, dan kan dit toch het eenige symptoom zijn van de ziekte van TOWNSEND en behoort men vitamine K toe te dienen. De aanvankelijk kleine bloeding wordt dan in de dagen van de hypothrombinaemia neonatorum grooter. Bepaalt men bij deze kinderen den prothrombinetijd, dan blijkt deze vaak aanmerkelijk verlengd te zijn, hetgeen wijst op een belangrijk prothrombinetekort. Men doet dus verstandig allen zuigelingen, die eenige dagen na de geboorte een cephalohaematoma hebben, vitamine K toe te dienen. Dit is in die gevallen veel belangrijker dan de punctie, die lang niet alle obstetrici aanraden, daar het bloed meestal in den loop van 3 tot 12 maanden weer geresorbeerd wordt.

Limmen (N.-H.), 12 October 1942

M. J. F. VAN OPPEN

## BERICHTEN

### BUITENLAND

CHILI. — MENINGITISEPIDEMIE. De meningitisepidemie breidt zich uit. In Santiago werden 700 zieken aangegeven, in Valparaiso 400. Op vele plaatsen zijn de scholen gesloten (*Münchener medizinische Wochenschrift*, 1942, blz. 824).

DENEMARKEN. — EEN AMBTELIJK ONDERZOEK NAAR DE VOEDING. Het departement voor statistiek heeft dit voorjaar gedurende vier weken een onderzoek ingesteld naar de voeding van 300 gezinnen in verschillende deelen des lands, zoowel van arbeiders als van personeel der posterijen en spoorwegen. Het gemiddelde voedsel per persoon per dag vertegenwoordigde 2366 calorieën (eiwit 71, vet 82.9 en koolhydraten 335.7 g). Bepalingen bij arbeiders en werklozen in 1940 gaven 3277 en 2821 calorieën. De uitgaven bleven ongeveer gelijk daar de prijs van het voedsel, vergeleken met 1940, van 1.32 kronen tot 1.74 kronen per 3000 calorieën was gestegen (*Ugeskrift for Laeger*, 1942, blz. 920).

DUITSCHLAND. — BRUNO LANGE OVERLEDEN. Prof. BRUNO LANGE, hoofd eener afdeling van het Instituut ROBERT KOCH en bekend door zijn onderzoekingen over tuberculose, is overleden (*Zeitschrift für Milch- und Fleischhygiene*, 1942, blz. 276). LANGE leidde in 1930 het onderzoek naar de oorzaak van de ramp te Lübeck en toonde aan, dat CALMETTE's entstof vrij uitging.

— GEVITAMINISEERDE WAREN. De minister van binnenlandsche zaken heeft bepaald, dat levensmiddelen aan welke vitamines zijn toegevoegd, slechts dan als zoodanig in den handel mogen worden gebracht, indien zij bij het „Reichsgesundheitsamt” zijn aangegeven (*Münchener medizinische Wochenschrift*, 1942, blz. 824).

— POLIOMYELITISSERUM GEVRAAGD. De President van het „Reichsgesundheitsamt” richt zich tot de ouders van kinderen die na 1932 aan kinderverlamming hebben geleden en ouder dan 6 jaar zijn, met de aansporing het bloed dezer kinderen voor therapeutisch doeleinde beschikbaar te stellen (*Klinische Wochenschrift*, 1942, blz. 848).

— BEPERKING VAN DE VERPLEEGSTERSTAAK. In vele ziekenhuizen doen de verpleegsters allerlei huishoudelijk werk, dat ook door ongeschoolde krachten kan worden verricht. Van ambtelijke zijde wordt hier aanmerking op gemaakt (*Wiener klinische Wochenschrift*, 1942, blz. 696).