

2 dagen een lichte urobilinurie had is evenmin een „tegenstrijdigheid”, daar een intercurrente infectie bij voorbeeld urobilinurie kan veroorzaken.

Mijns inziens is BUNGENBERG DE JONG er dan ook allerminst in geslaagd het ontstaan van urobilinogeen alleen uit indirect bilirubine te weerleggen.

Tiel, 18 October 1942

J. W. G. TEN BOKKEL HUININK

CEPHALOHAEMATOMA

Met belangstelling las ik in dit *Tijdschrift* van 10 October de zoewel van theoretisch als van practisch standpunt zoo juiste en wel overwogen clinische les van prof. ROEGHOLT. Kort en krachtig en overtuigend, zoodat zij steun geeft aan den huisarts voor zijn handelen. Immers juist bij deze eenvoudige gevallen uit de practijk wil nogal eens twijfel bestaan over al of niet ingrijpen en het is goed, dat van „hoogerhand” dan de besliste wijze van handelen en het waarom wordt aangegeven.

Ik herinner mij, dat zich, na verdwijning van het caput succedaneum, bij mijn zoon een flinke zwelling op het linker wandbeen vertoonde, die ik twaalf dagen na de geboorte puncteerde, waarbij 8 cm³ donker bloed verwijderd werd. In een reageerbuis bewaard, was dit vier weken later nog volkomen vloeibaar. Vier dagen na de punctie was de bloedholte weder, hoewel slapper, gevuld, doch tien dagen later was de vloeistof — zonder tweede punctie — spontaan geresorbeerd. Een verschijnsel, dat evenmin ongewoon is na een eenmalige vochtverwijdering uit de borst- of buikholte.

Een juiste opmerking omtrent de vitamine K-behandeling van bloedingen, die samenhangen met hypochrombinaemia neonatorum, maakte collega VAN OPPEN in verband met het cephalohaematoma. Dat het bloed meestal in den loop van 3 tot 12 maanden geresorbeerd wordt, acht ik allerminst een argument om de punctie te verzuimen, vooral in aanmerking genomen het feit van mogelijke verbeening.

Utrecht, 14 October 1942

K. A. ROMBACH

BERICHTEN

BUITENLAND

CANADA. — DE PROSTITUTIE TE VANCOUVER. In 1931 zijn in de havenstad Vancouver de bordeelen gesloten. Gaat men de ziekenhuiscijfers der geslachtszieken na, dan vindt men na de sluiting de veelvuldigheid van bijna 300 tot 175 behandelde mannen per maand gedaald (*Zentralblatt für die gesamte Hygiene*, deel 50, blz. 35).

DUITSCHLAND. — VACCINATIE TEGEN POKKEN. De twaalf koepokinrichtingen verkregen in 1940 van 146 kalveren gemiddeld 79 g koepokstof per kalf. Het aantal geleverde doses koepokstof steeg van 9953137 in 1939 tot 10397524 (*Reichsgesundheitsblatt* 1942, blz. 247).

— BOUWPLANNEN. SCHÖNBEIN geeft zich in *Der soziale Wohnungsbau in Deutschland* rekenschap van de eischen, die het nationale woningplan — na den oorlog zullen 600000 woningen per jaar worden gebouwd — ten aanzien van bouwmetaal en arbeidskracht zal stellen. Het zal noodig zijn holle steenen en muurplaten uit lichte grondstoffen te vervaardigen, waardoor de arbeidspraestaties van den metselaar zullen toenemen. Bij zuinige toepassing zullen ijzer en hout toereikend blijken. Productie van woningen in het groot zal worden bevorderd door montage van gestandaardiseerde deelen. De afkeer tegen gestandaardiseerde producten zal men in Europa moeten overwinnen (*Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedenbouw* 1942, blz. 133).

GEHEIME RAAD BUMM OVERLEDEN. — Dr. FRANZ BUMM, oud-president van het „Reichsgesundheitsamt”, is op 81-jarigen leeftijd overleden (*Wiener klinische Wochenschrift* 1942, blz. 716).

EGYPTE. — EEN DUIZENDJARIGE UNIVERSITEIT. De Universiteit El Azar te Caïro herdacht 18 September haar stichting vóór 1000 jaren (*Schweizerische medizinische Wochenschrift* 1942, blz. 1088).