

Toen onze jongen in Mei van dit jaar schriftelijk examen moest afleggen voor het M.U.L.O. examen Ben hem door een lid der examencommissie werd gevraagd: „Bent U doofstom?” antwoordde hij: „Nee mijnheer, ik ben wel doof maar niet stom”. Eigenlijk volkomen terecht.

Loppersum, 26 October 1942

A. NANNINGA—BOON

RHACHITISPROPHYLAXIS

Naar aanleiding van het artikel van mej. A. VAN ORMONDT en mej. M. E. VAN LINT (*N. T. v. G.*, 24 October 1942) wil ik gaarne het volgende opmerken. De schrijfsters geven de voorkeur aan de toediening van groote hoeveelheden vitamine D₃ per inspuiting boven de perorale toediening van vitamine D₂. Tevens veronderstellen zij, dat voor een voldoende resorptie van het per os gegeven vitamine D gelijktijdige toediening van melk gewenscht is. Te Rotterdam gaven wij in den afgelopen winter aan ongeveer 15000 kinderen tweemaal 7.5 mg vitamine D₂ in olie opgelost per os, zonder dat melk terzelfdertijd werd gegeven. Voor zoover wij konden nagaan, heeft bij geen dezer kinderen deze rhachitisprophylaxis gefaald ¹⁾. Op een tweehonderdtal contrôlephoto's, die wij bij de aldus behandelde kinderen in het voorjaar van 1942 maakten, was geen rhachitis te zien. Dit maakt het mijns inziens zeer waarschijnlijk, dat met een perorale toediening van vitamine D₂ zonder extra toevoeging van melk een goede rhachitisprophylaxis wordt verkregen.

Dwang, zooals de schrijfsters voorstellen, kan, indien een goede propaganda wordt gevoerd, worden gemist. Te Rotterdam bereikten wij zonder dwang meer dan 90 pCt. van de kinderen, die in het Bevolkingsregister waren ingeschreven.

Tenslotte lijkt mij de voorgestelde methode weinig oeconomisch. De 60000 eenheden vitamine D₂, waarmee wij het kind een jaar voor rhachitis behoeden, kosten 36 cent, terwijl één injectie D₃ van 60000 eenheden f 2.88 kost.

Rotterdam, 24 October 1942

J. H. P. JONXIS

BERICHTEN

BUITENLAND

FRANKRIJK. — VACCINATIE TEGEN TYPHUS. In de Académie de médecine heeft RAMON medegedeeld, dat van September 1939 tot Mei 1940 in het Fransche leger slechts 144 gevallen van febris typhoidea (met 5 sterfgevallen) zijn waargenomen. In de vergelijkbare periode 1914—1915 bedroeg dit aantal 65000 ziektegevallen en 11000 sterfgevallen. Men schrijft dit toe aan de stelselmatige vaccinatie (*Schweizerische medizinische Wochenschrift*, 1942, blz. 872).

— MENINGOCOCCOSE IN HET LEGER. Van Januari tot April 1940 zijn in het leger 240 gevallen van meningococcose waargenomen, zonder epidemische ophooping. Toepassing van sulfanilamide had goed gevolg (*Schweizerische medizinische Wochenschrift*, 1942, blz. 1108).

ITALIË. — EEN VERZAMELWERK. Het onder redactie van PETRAGNANI en BARCHIESI te verschijnen verzamelwerk *Collana medico-biologica* zal uit zes rijk uitgegeven deelen bestaan en artikelen van bekende onderzoekers bevatten (*Schweizerische medizinische Wochenschrift*, 1942, blz. 1112).

VEREENIGDE STATEN. — SLACHTOFFERS VAN HET NATIONALE FEEST. Het aantal ongelukken op den nationalen feestdag (4 Juli) neemt af. In 1937 bedroeg het 7250, in 1941 2039. In laatstgenoemd jaar waren er elf sterfgevallen; 104 oogverwondingen tengevolge van vuurwerk leidden 9 maal tot blindheid (*Journal American medical Association*, 1942, blz. 463, ref. *Schweizerische medizinische Wochenschrift*, 1942, blz. 1108).

ZWEDEN. — WERELDSTATISTIEK DER HONDERDJARIGEN. Het centrale bureau voor de statistiek te Stockholm heeft de reputatie van Bulgarije bevestigd: dit land heeft

1) Dr F. M. C. HENGEVELD, Dr. J. H. P. JONXIS en J. D. LEBRET, Over het resultaat van de toediening ineens van vitamine D voor therapie en prophylaxe der rachitis, in *De ontwikkeling van de kindergeneeskunde in de afgelopen 50 jaar*, 1942.