

kunnen bovendien, zooals ik zeide, reeds uit de quanti- en kwalitatief onvoldoende voedselopneming worden verklaard.

De oude naam anorexia nervosa schijnt mij bij uitstek geschikt voor dit ziektebeeld, dat dan ook allereerst langs psychischen weg moet worden behandeld, al kan daarbij endocrine therapie misschien ondersteunend werken. De overwegende beteekenis der psychogene anorexie voor dit ziektebeeld wordt niet verminderd door de omstandigheid, dat er ook intern — secretorische stoornissen gevonden worden, die soms — met name de amenorrhoe en de verlaagde stofwisseling — kunnen blijven bestaan als de patiënt overigens geheel is hersteld.

's-Hertogenbosch, 1 December 1942

G. F. VAN BALEN

OESOPHAGUSSTRICTUREN NA ETSING MET LOOG

Het is zeer nuttig, dat collega STRUBEN juist in dezen tijd nog eens de aandacht heeft gevestigd op de verbranding van den slokdarm door het drinken van loog. De ervaringen in de Amsterdamsche clinic komen volkomen overeen met die te Groningen. Ook hier doet zich door de abnormale tijdsomstandigheden een sterke stijging voor.

Wij zagen sedert Januari 1941 18 patiënten met een chemische verbranding. In een periode van 14 jaren daarvóór slechts 12 (zie klinische les *N.T.v.G.* blz. 1682, 1940). Van deze 18 patiënten overleden er 2. Bij een kind ontstond mediastinitis in aansluiting aan een sondage; waarschijnlijk is hierbij een perforatie gemaakt, hoewel deze niet bij de obductie kon worden aangetoond. De tweede patiënt was een man van 57 jaar, die bijna 8 maanden geleden loog had gedronken, waardoor vrijwel de geheele mucosa en een groot gedeelte van de submucosa was afgestooten. Het afgietsel werd in zijn geheel uitgestooten. Met heel veel moeite lukte het hier den slokdarm weer doorgankelijk te maken. Patiënt is echter door een bloeding, waarschijnlijk uit een ulcus ventriculi, overleden. Bij de overige patiënten had de behandeling volledig succes. De aandoening is echter steeds ernstig.

Het voorstel van collega STRUBEN ook in ons land maatregelen te treffen (b.v. etiquettering van de flesschen) dient met nadruk te worden gesteund. Een groot aantal kinderen dronk vloeibaar zeepsurrogaat. De heer HUIZINGA, apotheker van het Academisch ziekenhuis, was zoo vriendelijk in één der gevallen een onderzoek in te stellen. Het bedoelde middel was wel een zeer slecht zeepsurrogaat, daar het vrijwel geheel bestond uit natriumhydroxyde. Er kan niet genoeg voor worden gewaarschuwd, dat deze sterk caustische oplossingen zeer gevaarlijk zijn voor inwendig gebruik.

Groningen, 8 December 1942

EELCO HUIZINGA

BERICHTEN

BUITENLAND

DUITSCHLAND. — ONDERZOEK VAN STUDENTEN OP TUBERCULOSE. In het tijdperk 1929—1931 vond men bij de studenten te München 0.31 pCt. „open” tuberculose; dit percentage daalde in het tijdperk 1939—1941 tot 0.12 pCt. Men heeft rekening te houden met de vóórkeuring voor den arbeidsdienst en den militairen dienst. Het percentage der actieve gesloten vormen schommelde tusschen 0.20 en 0.35 pCt. De vergelijkbare cijfers betreffende buitenlandsche (in hoofdzaak Bulgaarsche) studenten waren 0.64 en 0.54 pCt. (*Der öffentliche Gesundheitsdienst* 1942, blz. 316, A).

ITALIË. — MENSÀ MATERNA. De Opera nazionale maternità e infanzia heeft in een aantal plaatsen het initiatief genomen tot de instelling van een „mensa materna”, bestemd voor zwangeren (van de zesde maand der zwangerschap af) en zoogenden (tot aan het einde van de zesde maand van het zoogen). Aan de vrouwen, die hiervoor in aanmerking komen, wordt dagelijks een volledige maaltijd verschaft (*Il Policlinico* 1942, blz. 1586).

— EEN CENTRUM VOOR HYGIËNE. De afdeling voor openbare gezondheid van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken heeft een half millioen lire ter beschikking gesteld ter