

INGEZONDEN

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen

SCHAARSCHE GENEESMIDDELEN

Aan de indicaties met betrekking tot het gebruik van sulfas atropini (zie Tweede lijst van geneesmiddelen, waarvoor bepaalde indicaties zijn vastgesteld, d.d. 1 Februari 1943) wordt toegevoegd: postencephalitisches Parkinsonisme.

Voorts vestig ik er hierbij nog de aandacht op, dat in het algemeen voor de geneesmiddelen met een bijzondere indicatie (B.I.) geen iteraties meer zijn toegestaan.

's-Gravenhage, 9 Maart 1943

C. BANNING,
*Geneeskundig Hoofdinspecteur van
de Volksgezondheid.*

INENTING TEGEN POKKEN

Op de consultatiebureaux voor zuigelingen worden geen inenting tegen pokken verzocht, vanzelfsprekend zien wij er wel ingeente kinderen. Ik heb daarvan den indruk, dat in de laatste jaren de entpokken grooter en dieper zijn dan vroeger het geval is. Zij zijn vaker geconflueerd, terwijl de omgeving uitgebreider en harder geïnfilteerd is. Het kan zijn, dat deze sterkere reactie aan het oog van den vaccinateur ontgaat, omdat het hoogtepunt vaak pas na de contrôle wordt bereikt. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat de pokstof welke gebruikt wordt, sterker is dan voorheen. Ook bestaat de mogelijkheid, dat de gevoeligheid is toegenomen. Hoe het ook zij, het is wenschelijk, dat de vaccinatie zoo zorgvuldig mogelijk geschiedt en daarom wil ik in deze mededeeling enkele punten naar voren brengen, waarop blijkens de ervaring in het algemeen te weinig wordt gelet.

De entschapjes behoeven niet langer te zijn dan $\frac{1}{2}$ cm en moeten oppervlakkig zijn, er mag geen bloed uittreden. De onderlinge afstand bedrage tenminste 2 cm.

Kinderen, die nog niet zindelijk zijn, worden niet op de bovenbenen geënt. Het contact met urine en faeces kan kwaadaardige ulcera doen ontstaan.

Kinderen met huiduitslag mogen niet worden ingeënt, voordat het uitslag eenige maanden geheel genezen is. Kinderen met duidelijke exsudatieve diathese ente men niet, ook niet later, omdat door de vaccinatie de huidverschijnselen weer kunnen uitbreken. Evenzoo late men bij strophulus en urticaria de inenting voorloopig achterwege. Het krabben wegens den jeuk kan een ongewenschte verspreiding van de pokstof tot gevolg hebben.

Men houde zich streng aan de tegenaanwijzingen en doe steeds navraag naar het voorkomen er van. De moeders moeten worden onderricht, hoe de opkomende pokpuisten verzorgd moeten worden.

Door het opvolgen van deze eenvoudige aanwijzingen kan veel onnoodig leed worden voorkomen en worden de moeders minder vaak door een hevige reactie afkeerig gemaakt van de inenting.

Breda, 2 Maart 1943

P. J. M. HAANAPPEL,
districts-kinderarts

ISOLATIEDUUR VAN LIJDERS AAN DIPHTHERIE

Naar aanleiding van het ingezonden stuk van HUËT in dit *Tijdschrift* van 27 Februari j.l. zou ik het volgende willen opmerken:

Algemeen is bekend, dat een aantal genezen lijdens aan diphtherie zeer geruimen tijd virulente diphtheriebacillen in het neus-keelslijm kunnen herbergen. Het is echter onmogelijk dergelijke personen zoolang in het ziekenhuis te houden tot bij hen drie maal achtereen geen ziektekiemen meer zijn aangetoond. Zou men dit doen, dan zou het ziekenhuis hierdoor het karakter van een verpleeginrichting al spoedig gaan verliezen en zou het gaan lijken op een gezellig kindertehuis. Kostbare ziekenhuisplaatsen zouden worden

ingenomen door personen, die geen of ternauwernood ziekenhuisverpleging van noode hebben. Vooral is dit ontoelaatbaar in een tijd van een uitgebreide diphtherie-epidemie, waarin een tekort aan ziekenhuisruimte noopt tot het thuis laten van ernstige zieken en zich iederen dag opnieuw weer dezelfde puzzle voordoet, welke patiënten, voor wie ziekenhuisopneming gevraagd wordt, beslist dienen te worden opgenomen en wie van de zieken zonder al te groot gevaar voor zichzelf en voor hun omgeving thuis verpleegd kunnen worden. En dan moeten soms nog zieken onder slechte sociale omstandigheden één of meer dagen en soms gedurende het geheele ziektebeloop thuis worden gelaten. Zoo nopen dan ook gebrek aan ziekenhuisruimte en de uitgebreide diphtherie-epidemie de zieken niet langer in het ziekenhuis te houden dan beslist voor de behandeling en verpleging noodig is en moet het gevaar van het ontslaan van bacillendragers wel op den koop toe worden genomen. De ervaring heeft evenwel geleerd, dat dit gevaar bestaat, doch niet overdreven groot moet worden gezien.

Amsterdam, 5 Maart 1943

dr. H. PEETERS

BERICHTEN

BUITENLAND

DENEMARKEN. — BEHOEFTE AAN MORPHINE. Daar een kilogram morphine thans 220 Kronen kost — het zevenvoudige van den prijs van vóór den oorlog — heeft men besloten het papaverzaad van eigen bodem te oogsten. De voorproeven zijn geslaagd, zoodat men tegen dit voorjaar 50 ha voor de teelt van Papaver somniferum heeft gereserveerd (*Münchener med. Wochenschr.*, blz. 98, 1943).

DUITSCHLAND. — DE V. EICKEN-PRIJS. De v. EICKEN-prijs, in het jaar 1944 uit te reiken, is bestemd voor een pharmacologisch geschrift. De prijs-1943 (physiologie) is over 4 mededingers verdeeld (*Münchener med. Wochenschr.*, blz. 98, 1943).

— MASSAAL RÖNTGENOLOGISCH ONDERZOEK. Prof. HOHLFELDER, de man van de verkleinde Röntgenphoto, beschikt thans over een bataljon photographen, die in kleine groepen 2000 opnamen per dag doen; meer dan 7 millioen personen zijn door hen onderzocht. Behalve tuberculose herkent men hart- en vaatziekten en tumoren (*Deutsche med. Wochenschr.*, blz. 72, 1943).

— INSTITUUT VOOR GERECHTELIJKE GENEESKUNDE. Aan de Universiteit te Freiburg i. Br. is een instituut voor gerechtelijke geneeskunde geopend (*Schweizerische med. Wochenschr.*, blz. 140, 1943).

— INSTITUUT VOOR VITAMINOLOGIE. Te Berlijn is een Rijksinstituut voor wetenschappelijk onderzoek van vitamines en ter contróle van vitaminepraeparaten geopend. Het zal de rijksregeering bij vitaminologische vragen van advies dienen (*Münch. med. Wochenschr.*, blz. 78, 1943).

ENGELAND. — VERZORGING MET VITAMINE C. De kinderen, die door volkskeukens en weldadigheidsinstellingen worden gevoed, kregen dezen winter geconcentreerd sinaas-appelsap, dat 160 mg ascorbinezuur per 100 g bevat (*Schweizerische med. Wochenschr.*, blz. 140, 1943).

VEREENIGDE STATEN. — EEN ZIEKENHUIS VOOR KANKERLIJDERS. In samenwerking met de Columbia Universiteit bouwt de stad New York een kankerziekenhuis met 350 bedden (*Schweizerische med. Wochenschr.*, blz. 56, 1943).

— DE TUBERCULOSE DER LEERLINGVERPLEEGSTER. Te Philadelphia werden 643 leerlingverpleegsters gedurende 4 jaren geobserveerd. Bij haar toelating reageerden 28.5 pCt. sterk en eveneens 28.5 pCt. zwakker op tuberculine; na 4 maanden was reeds bij de helft der negatief reageerenden de reactie positief geworden, na een jaar bij 86 pCt.

Groot verschil in voorkomen en beloop tusschen de aanvankelijk negatieven en de aanvankelijk positieven zag men niet (*Schweizerische med. Wochenschr.*, blz. 50, 1943).

J. J. VAN LOGHEM