

OPTISCHE HALLUCINATIES BIJ OMSCHREVEN AANDOENING DER FRONTALE HERSENEN

Collega F. TH. TER HAAR te Winterswijk vraagt, of in het door mij beschreven ziektegeval vóór of na de operatie sedativa aan den patiënt zijn toegediend en zoo ja, of ik het uitgesloten acht, dat deze een invloed op het cerebrum hebben uitgeoefend in denzelfden zin als het organische hersenletsel. Patiënt kreeg drie maal daags 30 milligram luminal per os gedurende de week vóór de operatie, welke behandeling gedurende het verdere verblijf in de kliniek werd toegepast, dus ook nadat de hallucinaties reeds verdwenen waren. 's Morgens vóór de operatie gaf dr. C. H. LENSHOEK 100 milligram luminal intramusculair en 10 milligram morphine met $\frac{1}{4}$ milligram scopolamine subcutaan, zooals hij gewoonlijk doet bij grootere hersenoperaties. De chirurgische ingreep zelf werd gedaan onder plaatselijke gevoelloosheid. Ik acht het uitgesloten, dat deze geneesmiddelen de hallucinaties hebben te voorschijn geroepen. Zij ontstonden immers pas den tweeden dag na de operatie. Dat optische hallucinaties door herhaald toedienen van sedativa kunnen ontstaan, zag ik evenals collega TER HAAR bij verschillende patiënten en heb dit ook persoonlijk ervaren. Vier en een half jaar geleden heb ik na een galsteenoperatie een complicatie met etterige parotitis doorstaan. Na een reeks onderhuidsche injecties van dilaudid kreeg ik zoodanige onaangename optische hallucinaties, dat ik liever de pijn verdroeg en mij met aspirine behielp. In welk gedeelte van het centrale zenuwstelsel dergelijke vergiften moeten aangrijpen om soortgelijke hallucinaties te verwekken, is mij niet bekend.

Collega dr. T. KUIPER te Heerlen maakt mij opmerkzaam op een schrijffout op blz. 506, regel 2 van boven. Sulcus centralis anterior moet veranderd worden in sulcus praecentralis. Beide collegae dank ik voor hun belangstellende opmerkingen.

Amsterdam, 24 Maart 1943

B. BROUWER

BERICHTEN

BUITENLAND

BELGIË. — **BESTRIJDING VAN KANKER.** De Ligue nationale contre le cancer heeft ondanks den oorlog haar in 1931 aangevangen maatschappelijken arbeid voortgezet. In 1940 waren 18475 zieken bij haar ingeschreven, in 1941 21277. Het aantal bezoeken aan patiënten gebracht, bedroeg in het laatstgenoemde jaar 18156. In 2000 gemeenten zijn haar organen werkzaam.

Drie groote verzekeringsmaatschappijen hebben een caisse anticancéreuse gesticht en deze onder toezicht van de Ligue gesteld. Deze samenwerking heeft in de eerste plaats ten doel de ziekte- en sterftestatistiek van kanker te verbeteren.

De verschijning van de propaganda-organen *Opinion publique* en *Elk doet mee* is tijdelijk gestaakt. De belangstelling van velen blijkt uit de geldmiddelen; een bibliotheek ten dienste van de kankerstudie is ter beschikking van de vier geneeskundige faculteiten gesteld (*Monatsschr. f. Krebsbek.*, blz. 36, 1943).

DENEMARKEN. — **TELLING VAN KANKERLIJDERS.** Den 15en Februari werd wederom met medewerking van de behandelende geneesheeren een telling van de lijdens aan kanker gehouden. Alle artsen ontvingen daartoe formulieren ter invulling (*Ugeskrift for Laeger.*, blz. 170, 1943).

DUITSCHLAND. — **CONSULTATIEBUREAUX VOOR KANKERLIJDERS.** In 1940 zijn te Hamburg 4 consultatiebureaux voor kanker geopend. Bij 10 pCt. van de menschen, die zich aanmeldden, werd de diagnose gesteld. Voldoening geeft de ervaring, dat de meeste vrouwen met carcinoma mammae zich in het eerste stadium der ziekte bevonden (*Monatsschr. f. Krebsbek.*, blz. 35, 1943).

— **INENTING TEGEN VLEKTYPHUS.** De inenting tegen vlektyphus is als volgt gedoseerd: de eerste maal spuit men met tusschenpoozen van 5 dagen 0.5, 0.5 en 1 cm³ eicultuur uit Frankfort in; bij de eerste herinenting na een jaar 0.5 en 1 cm³; bij de tweede herinenting na een jaar 1 cm³. Voor artsen en verplegend personeel is een bijzondere entstof uit Berlijn beschikbaar (*Münchener med. Wochenschr.*, blz. 98, 1943).