

# INGEZONDEN

*De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen*

## ECZEEM NA KWIKVERGIFTIGING, GELIJKEND OP DAT BIJ ROODVONK

Naar aanleiding van mijn artikel over „Een geval van kwikvergiftiging gelijkend op roodvonk” (*N. T. v. G.*, 10 April 1943), ontving ik van een collega de volgende belangwekkende mededeeling.

„Naar aanleiding van uw casuïstische mededeeling herinner ik mij een jongeman van nog geen 20 jaar, bij wien ik geroepen werd, omdat hij volgens de huisgenooten en een bezoekende dame die zelf kinderen had die aan roodvonk leden, roodvonk zou hebben. De patiënt was naar bed gestuurd; hij was vuurrood, had een zeer frequenten pols en een rectale temperatuur van bijna 40° C (eigen contrôle rectaal). Hij had niet gebraakt, het heele lichaam was bedekt met een diffuus rood exantheem, de wangen waren gezwollen en rood, de keel was wel rood, doch *minder* dan ik gewoonlijk bij roodvonk zag; het exantheem leek mij te sterk voor roodvonk. Bij contrôle van het onderlichaam trof mij de zwellings van den penis en de roodheid van de huid van het membrum, doch de zaak werd opgehelderd door de resten van het unguent. cinereum, waarmede de patiënt het onderlichaam had ingesmeerd ter bestrijding van morpiones. De familie ging niet accoord met mijn diagnose, want voor haar stond roodvonk vast.

Een specialist voor infectieziekten vond het geval belangwekkend en bevestigde mijn opvatting, dat het geen roodvonk was.

Een flinke afwassching om de resten der kwikzalf te verwijderen en wat speeksteenpoeder werden toegepast. Na een paar dagen waren temperatuur en pols weer normaal, de huid schilferde reeds na een week, vooral op den rug, den buik en de bovenbenen. Patiënt had zich met de „ruiterzalf” alleen des avonds ingesmeerd, de reactie was dus zeer snel en hevig; blijkbaar was deze jongeman buitengewoon overgevoelig voor kwik.

Ik moge er bij voegen, dat hier sprake is van plaatselijke applicatie van kwikzalf, terwijl het bij mij ging om een geval, waarin kleine hoeveelheden calomel per os genomen waren. Van een anderen collega vernam ik ook, dat hij na het gebruik van kwikzalf wel vaker dergelijke exanthenen zag:

Amsterdam, 30 April 1943

J. G. MENKEN

## NEUROLOGISCHE AFWIJKINGEN NA ERNSTIGE BLOEDINGEN

In ons artikel „Over neurologische afwijkingen ontstaan na ernstige bloedingen”<sup>1)</sup> deelden wij mede, dat patiënt X een potator was, zoodat het gerechtvaardigd zou zijn de neurologische afwijkingen bij den patiënt, ontstaan na een ernstige maag-darmbloeding, mede in verband te brengen met een mogelijke alcohol-intoxicatie. De man was echter geen chronische alcoholist, doch een kwartaaldrinker die zich soms en wel met groote tusschenpoozen van enkele maanden tot een jaar aan alcohol te buiten ging. Overigens was in de familie-anamnese niets bekend omtrent een alcohol-intoxicatie, noch hereditaire belasting, zooals ook bleek uit het eerste algemeene onderzoek. In hoeverre het alcoholgebruik antecedenten schiep voor het ontstaan van deze afwijkingen, is moeilijk uit te maken. Mogelijk is echter, dat daardoor de overvloedige bloeding praedisponeerde voor de neurologische en psychische afwijkingen, doch geenszins de rechtstreeksche oorzaak daarvan was.

Nijmegen, 27 April 1943

A. C. M. LIPS en E. M. HESLINGA

## BUITENLANDSCHE MEDISCHE GESCHRIFTEN

Sedert eenigen tijd is er een regeling getroffen, volgens welke het betrekken van buitenlandsche medische boeken en tijdschriften slechts toegestaan is aan enkele bibliotheken van universiteiten en andere instellingen, die daartoe bovendien nog een voor elk geval

<sup>1)</sup> *N. T. v. G.* van 23 April 1943.