

BRIEFWISSELING

Het register van d n jaargang 1943 zal binnenkort afzonderlijk worden toegezonden.

REDACTIE

INGEZONDEN

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen

GROENTEN EN FRUIT VOOR ZIEKEN

In aansluiting aan de publicaties van 25 September en 19 October 1943 betreffende de verstrekking van groenten en fruit aan zieken, deel ik aan de artsen mede, dat behalve de diabeteslijders thans ook de lijders aan spruw en aan ernstige vormen van anaemie (haemoglobinegehalte SAHLI beneden 65 gecorr.) voor extra bonnen in aanmerking komen. Voor deze patiënten handele men dus evenals voor de diabeteslijders: aanvragen op MD 133—01 van de *totale hoeveelheid* groenten en fruit, dat is $1\frac{1}{3}$, 2 of 3 maal het burger-rantsoen.

C. BANNING.

*Geneeskundig Hooftinspecteur
van de Volksgezondheid*

Bilthoven, 15 December 1943

DOSEERING DER LEVERPRAEPARATEN BIJ PERNICIEUSE ANAEMIE

Uit het vinden van gelijke waarde voor Q, bij veel lagere doseering 1), trok ik geenszins de conclusie (zoals collega REISBERMAN meent 2)), dat daardoor de ijkingsmethode niet geschikt is. Integendeel, ik acht deze juist, en mijn eenige gevolgtrekking is, dat met een veel lagere doseering een gelijk, even goed resultaat wordt bereikt, met andere woorden dat de „gebruikelijke doseering” (al komt die dan ook in vele boeken voor) wel gebruikelijk, doch geenszins juist behoeft te zijn (zie ook GÄNSS EN 3)). In tijden als deze, met schaarschte van praeparaten, is de laagste doseering gewenscht, zeker als deze niet onderdoet voor de hoogere.

Wat betreft de opmerking over het ontbreken in mijn tabel van het hoogste haemoglobinegehalte met de tijden waarin dit werd bereikt, wijs ik op de opmerking in den tekst 1), dat een egale kromme met één injectie in de 2 à 3 weken verkregen werd, terwijl dan 2 à 3 inspuitingen voldoende zijn om een normaal bloedbeeld te krijgen (m.a.w. 5 à 6 weken).

Rotterdam, 7 December 1943

J. BOK

LOCALISATIE VAN PUPILSTOORNISSEN DOOR PHARMACOLOGISCHE REACTIES

Op blz. 1767 van het *Tijdschrift* No. 48/49 komt HORSTEN nog eens terug op mijn publicatie en mijn antwoord op zijn ingezonden stuk. Wanneer HORSTEN zegt, dat het woord cholinergisch duidelijk te verstaan geeft, dat het object functionneert *door middel van* choline ben ik het geheel met hem eens. Ik kan hem echter niet volgen, wanneer hij daaruit concludeert „dat dus alleen de zenuw bedoeld kan zijn”. De spier functionneert *door middel van* choline; toch niet de zenuw? Op grond van dezelfde taalkundige overweging meen ik dan ook te mogen vasthouden aan het begrip cholinergische spier.

Belangrijker dan dit taalkundige geschilpunt is overigens de quaestie of de omschakeling van de sympathische baan voor de irismusculatuur plaats vindt in het ganglion stellatum dan wel in het ganglion cervicale superius. Het is mij bekend, dat men op grond van proeven

1) N. T. v. G. blz. 1721, 46/47, 1943.

2) N. T. v. G. blz. 1767, 48/49, 1943.

3) *Med. Klin.* blz. 533, 1936.