

moeilijkheid verschoven. Immers de beide eerste gevallen door SNAPPER beschreven als lipoidgranuloom, hebben dezen zelf veel hoofdbrekens gekost. Beide gevallen toch toonden abnormale pigmentaties (het meisje leed bovendien aan pubertas praecox!!) zonder de typische verschijnselen van de ziekte van HAND-SCHÜLLER-CHRISTIAN en bij beide kon prof. DE VRIES slechts na herhaalde proefuitbeiteling schuimcellen vinden. Het is dan ook niet te verwonderen, dat er stemmen zijn opgegaan, die deze diagnose in twijfel trekken en de schuimcellen als degeneratieproduct opvatten. Collega REISBERMAN zal het tenslotte met mij eens zijn, dat de ziekte van ALBRIGHT als differentieel-diagnosticum wel in aanmerking komt en zeker eerder dan een carcinose bij een jongen van 20 jaar met normale bezinking en een ziektebeloop van 10 jaar!

Berg en Dal, 11 Juli 1944

E. M. HESLINGA

LUESBESTRIJDING

Zou het in verband met de sterke toeneming van lues niet mogelijk zijn de WASSERMANN-reactie kosteloos te laten geschieden? Men zie ook het *Tijdschrift* van 1 en 8 Juli 1944, blz. 641, over het veelvuldig voorkomen van lues latens e causa ignota.

Amersfoort, 14 Juli 1944

A. C. H. HÖWELER, *heel-, neus-en oorarts*

ERGOMETRINE BIJ DE BEVALLING

Met belangstelling heb ik het artikel van collega SCHUT gelezen, waarin hij waarschuwt tegen het ondoordacht voorschrijven van ermetrine bij den partus. Zelf deed ik soortgelijke ervaringen op, met dit verschil echter, dat ik in de twee jaren, gedurende welke ik regelmatig ermetrine compositum „Organon” voorschreef ter inleiding van den partus of ter versterking van weëën, nooit eenig nadeel voor moeder of kind heb gezien, totdat Organon, waarschijnlijk door tijdsomstandigheden genoodzaakt, het hydrochloras-ermetrine door het ermetrine-tartraat heeft moeten vervangen. Bij 9 patiënten deed ik de volgende ervaring op:

Eenmaal afsterven der vrucht. Dosis 12 dragée's in 2 dagen.

Tweemaal ernstige asphyxie. Dosis 6 dragée's.

Viermaal matige asphyxie. Dosis 3 tot 6 dragée's.

Tweemaal geen bijzonderheden. Dosis 1 tot 3 dragée's.

Het ermetrine compositum durf ik in de huidige samenstelling niet meer toe te passen.

Lisse, 11 Juli 1944

F. HAASE Jr.

ERGOMETRINE BIJ DE BEVALLING

Collega SCHUT heeft critiek geleverd op het gebruik van ergometrine bij de bevalling. Terecht waarschuwt hij tegen de ernstige gevolgen van overdoseering van dit middel gedurende de bevalling. Bij twee van zijn waarnemingen is de doseering te hoog geweest en daardoor werd het kind dood geboren. Bij het derde geval is een normale doseering toegepast, namelijk van 6 tabletten ermetrine compositum. Bij deze vrouw werden eerst thuis ergometrine-compositum-tabletten gegeven, echter zonder resultaat. Hoeveel toen gegeven werd is tot mijn spijt niet vermeld. Later (hoeveel?) werd deze vrouw in een ziekenhuis opgenomen en kreeg toen 6 tabletten ermetrine compositum, om de 1½ uur één. Hierna ontwikkelde zich een tetania uteri, waardoor het kind stierf. Het is niet duidelijk waarom deze toestand bij de eerste toediening aan huis niet is ontstaan. Was de bevalling later reeds begonnen? Men moet bij een bevalling, die reeds in gang is, voorzichtig doseeren! Is het ook mogelijk, dat bij deze vrouw verkeerde tabletten zijn gebruikt evenals SCHUT voor een andere vrouw beschrijft? Het komt voor, dat in plaats van ermetrine compositum ++ ermetrine-tabletten worden gegeven. Hierin is de hoeveelheid ermetrine aanmerkelijk hooger. Deze ermetrine tabletten kunnen uitsluitend buiten de bevalling, bij voorbeeld in het kraambed of bij menstruatiestoornissen gebruikt worden. Het zou beter zijn om den naam ermetrine compositum te wijzigen, zoodat vergissingen bij de aflevering minder gemakkelijk kunnen voorkomen.

SCHUT vermeldt verder, dat hij somtijds een verhoogde spanning van den uterus heeft waargenomen. Deze verhooging van tonus vindt men ook soms na kleine giften pituitrine