

dat de electriche behandeling, zowel met den galvanischen als met den faradischen stroom, bij kinderen zelden aangewezen is, daar zij slechts bij uitzondering de uitkomsten van een goed geleide oefeningstherapie nog verbeteren kan. Slechts dan, wanneer een paretische spier uitsluitend door electriche prikkels tot contractie te brengen is, zal men deze moeten toepassen en dan nog, althans bij kinderen, in een vorm, die onpijnlijk is en niet het electricheeren tot een telkens terugkeerende kwelling en bron van onrust maakt.

Het is voldoende bekend, dat ook uitgebreide poliomyelitische verlammingen nog geruimen tijd na het doorstaan zijn van de infectie neiging tot verbetering blijven toonen en dat de kans op een functioneel goed resultaat door een zeer zorgvuldige en lang volgehouden nabehandeling belangrijk vergroot wordt. In het algemeen zal pas, wanneer vaststaat, dat met de oefentherapie geen verdere verbetering te bereiken is, overwogen moeten worden of orthopaedische behandeling tot vermindering van invaliditeit zal kunnen leiden, wat gelukkig vaak het geval zal blijken te zijn.

April 1944

## INGEZONDEN

*De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen*

### GENEESMIDDELEN-SCHAARSCHTE

In overleg met den Directeur van het Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen wijs ik de artsen op een mogelijkheid bij de behandeling van epilepsielijders op het gebruik van *luminal*, dat nog slechts in zeer geringe hoeveelheid voorhanden is, te besparen;

Hiervoor is ter beschikking het *diphantoïne*, dat hier te lande wordt gefabriceerd. Dit kan *luminal* althans gedeeltelijk vervangen. Het is niet gewenscht de *luminal*-behandeling plotseling geheel door *diphantoïne* te vervangen. Wel kan men echter de *luminal*dosis verminderen en de patiënten een combinatie voorschrijven van *luminal* of andere middelen met *diphantoïne*.

Voor nadere gegevens o.a. omtrent de doseering, verwijs ik naar het artikel van dr. A. VERJAAL in het *N. T. v. G.*, Jg. 85, No. 25 (2825-2828), 21 Juni 1941.

Bilthoven, 15 September 1944

C. BANNING,

*Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid*

## BERICHTEN

### BINNENLAND

DE CHIRURGISCHE HULP IN NEDERLAND. — In aansluiting aan het bericht over de mobiliseering van de chirurgische hulp in Nederland (dit *Tijdschrift*, blz. 780, No. 33/34), kan worden medegedeeld, dat er thans 4 groote chirurgische ploegen zijn ingericht en wel te Groningen, chef-chirurg prof. dr. L. D. EERLAND, telefoon 21241 en 28214; te Arnhem, chef-chirurg dr. P. DE GRAAF, telefoon 22810; te Utrecht, chef-chirurg dr. W. J. GERBER, telefoon 11918 en 11919 en te Leiden, chef-chirurg dr. H. G. RUHAAK, telefoon 24441 en 22902 (*Het Nederl. Roode Kruis*, No. 9, 1944). E. SLUITER

### PERSONALIA

OVERLEDEN: te Breda WILLEM JAN SCHEFFELAAR, arts, op den leeftijd van 41 jaar (6 September 1944); te Rotterdam JAN VRIJLAND MULLER, arts, in den ouderdom van 70 jaar (9 September 1944); te West-Grafdijk J. KOPPEN, arts aldaar (14 September 1944). REDACTIE

---

Hoofdredacteur: Prof. Dr. G. VAN RIJNBEEK te Amsterdam  
Verantwoordelijk voor de advertenties: Mej. Dr. E. SLUITER te Amsterdam  
Uitgever: De Erven F. BOHN N.V., Frankestraat 42 te Haarlem  
Drukker: ELLERMAN, HAPMS & Co. N.V., Warmoesstraat 147—151 te Amsterdam