

uitgelokte ingezonden stukken vond, is het *pituütrine*. Ik gebruik het op deze indicatie naar aanleiding van een publicatie in de *Arch. of Derm. a. Syph.*, dl 22, no.1. Mijn ervaring is als volgt: Ik heb steeds piton gebruikt. In bijna alle gevallen waren twee injecties voldoende, niet alleen voor het herpes-uitslag, maar ook voor de neuralgie, zoodat ik gewoonlijk geen derde inspuiting liet volgen.

Een bezwaar, dat, naar ik meen, in de genoemde publicatie niet besproken werd, was de sterke vasomotorische reactie, die sommige patiënten, vooral (niet uitsluitend) de mannelijke, toonen; enkelen kregen heftige darmkrampen en diarrhee. Patiënten met myocardaandoeningen of hypertensie durfde ik dan ook niet met dit middel te behandelen. De dosis, die mij het beste bevalt, is de eerste maal 3 à 5 E., twee dagen later 5 à 8 E. en, zoo noodig, nog 3 dagen later weer 5 à 8 E.

De patiënten, bij wie ik, om bovengenoemde redenen, het middel tegenaangewezen vond, behandelde ik met vitamine B₁ (forte: injecties met 25 mg aneurine). Steeds troffen mij de veel langere duur en de minder zekere werking hiervan, wat natuurlijk ook veroorzaakt kan zijn door de omstandigheid, dat het hierbij meestal om oudere personen gaat, bij wie, zooals coll. HOELEN ook opmerkt, de neuralgie na zoster-infectie gewoonlijk veel hardnekkiger is dan bij jonge menschen. Toch behandelde ik een vrouw van 64 jaar en een van 65 jaar, die beiden na 2 pitoninspuitingen binnen een week haar klachten geheel kwijt waren!

Winterswijk, 7 September 1944

F. TH. TER HAAR

DE SAMENSTELLING VAN ENKELE, THANS VEEL GEBRUIKTE VOEDINGSMIDDELEN

Op verzoek van een onzer lezers geven wij hier de ons door prof. B. C. P. JANSEN verstrekte gegevens betreffende de samenstelling van enkele thans veel gebruikte voedingsmiddelen.

Samenstelling in pCt.

	H ₂ O	asch	eiwit	vet	ruwe celstof	koolhydraat
Koolzaadkoek of raapzaadkoek	11	7	32	8	13	28
Maanzaadkoek	11	13	33	8	11	24
Natte pulp v. suikerbiet (uitgetrokken) 1)	90	0.5	0.8	0.3	2.3	5.7
Gedroogde pulp van suikerbiet (uitgetrokken).	11	4	7	2.5	20	54
Tulpenbollen			1.5			30
Selderijknol			2	0.4		7

Maanzaadkoek bevat vaak nog sporen opium-alcaloïde; vooral bij kinderen mag men dus niet te veel verstrekken.

Voor selderijknol en andere „normale” menselijke voedingsmiddelen kan worden gewezen op de Nederlandsche voedingsmiddelentabel, die tegen betaling van f 0.15 te verkrijgen is bij het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad, Dr. Kuypersstraat 8, den Haag (postgiro 363081).

19 April 1945

REDACTIE

BERICHTEN

PERSONALIA

OVERLEDEN: te Amsterdam dr. J. G. POMPE, arts te Amsterdam (15 April 1945).

1) In de niet-uitgetrokken suikerbieten bevindt zich plm. 15 pCt. suiker.

Hoofdredacteur: Prof. Dr. G. VAN RIJNBEEK te Amsterdam

Verantwoordelijk voor de advertenties: Mej. Dr. E. SLUITER te Amsterdam

Uitgever: De Erven F. BOHN NV., Frankestraat 42 te Haarlem

Drukker: ELLERMAN, HARMS & Co. NV., Warmoesstraat 147—151 te Amsterdam