

kregen *in de herfstmaanden*; de incubatietijd duurt in ons land gewoonlijk 8 tot 9 maanden, de ziekte komt dus pas *het volgende jaar tot uitbarsting*. Malaria na korten incubatietijd, zoogenaamde herfstmalaria, is echter niet geheel uitgesloten. Recidieven — eenige weken of maanden na den eersten aanval — komen ook bij goed behandelde malaria voor.

Het is dus denkbaar, dat menschen, die hier in den herfst van 1944 vertoefden, geïnfecteerd werden en na terugkeer in hun woonplaats malaria krijgen of, indien de eerste aanval in Friesland reeds plaats had, elders aan een recidief gaan lijden.

Willen wij het ziektegevaar wel van den zeer somberen kant bekijken, dan moet ook gewezen worden op de theoretische mogelijkheid, dat parasietendragers in tot nu toe malariavrije streken muggen (*Anopheles maculipennis atroparvus*) besmetten, die de daar wonende bevolking infecteeren, waarmee een nieuwe haard is gevormd. Letten we op het kaartje van de verspreiding van malariamuggen in Nederland 1), dan zien we, dat de gevreesde mug ook op tal van malariavrije plaatsen is waargenomen.

Voor de bestrijding van malaria komt in de eerste plaats kinine in aanmerking. Noodig is een gift van 1 gram per dag aan volwassenen en grootere kinderen, terwijl aan kleine kinderen voor ieder levensjaar een dagelijksche dosis van 100 mg, tot een maximum van 1 gram per dag gebruikelijk is. Men geve een kuur van een week, zonder nabehandeling. Een zeker aantal recidieven is ook met nakuren niet te vermijden; deze behandelde men op gelijke wijze als den primairen aanval.

Voor het zeker vaststellen van malaria make men een bloedpraeparaat (liefst een uitgetrokken dikke-druppelpraeparaat); het onderzoek daarvan kan in verschillende laboratoria in malariagebieden geschieden.

Het einde van het malariaseizoen begint alweer te naderen, het eerder plaatsen van deze mededeeling was helaas niet mogelijk! Berichten, over uit Friesland ingevoerde malaria worden door ondergeteekende gaarne ontvangen.

Aug. 1945

J. C. M. DE JONG,

Leider rijksdienst voor de Malariabestrijding
in Friesland, gevestigd te Bolsward

B E R I C H T E N

BRIEFWISSELING

Hulp aan Arnhem. Daar de bibliotheek van de Afdeling Arnhem en omstreken der Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst geheel verbrand is, wordt den collegae verzocht zoo mogelijk boeken en tijdschriften af te staan voor den heropbouw dezer bibliotheek. Wellicht kunnen deze tezamen met andere giften van de „moeder-stad” Amsterdam worden verzonden. Wij hebben reeds enkele boeken in dank ontvangen.

Arnhem, 16 Augustus 1945

L. DOOREN, biblioth.

Welke arts uit het concentratiekamp te Dachau kan inlichtingen geven over HENDRICUS LEONARDUS HEY, geboren 16 April 1914 te Hilversum en gewoond hebbende te Krommenie. Volgens geruchten zou hij tusschen 1 en 5 Mei 1945, dus na de bevrijding van Dachau, zijn overleden, maar officieel is daarvan niets bekend. Berichtgevers gelieven zich zoo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met Mevrouw M. HEY—EVERTSE, Lindelaan 5, Krommenie.

REDACTIE

PERSONALIA

IN MEMORIAM DR. LEMBERTUS DE JAGER. — Voor de ouderen wil ik de figuur van dezen innemenden collega nog eens voor den geest roepen, voor de jongeren hem ten voorbeeld stellen. Hij verdiende dit ten volle door zijn eenvoud, gemoedelijkheid, open karakter, groote werkkraft en begaafdheid.

DE JAGER werd op 14 October 1863 te Dokkum geboren, waar zijn vader geneesheer was. Op 17-jarigen leeftijd slaagde hij, door privaattlessen, voor het staatsexamen, werd 16

1) N. H. SWELLENGREBEL en A. DE BUCK, *Malaria in the Netherlands*. Amsterdam, 1938.