

INGEZONDEN

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen.

DISTRIBUTIE VAN GROENTE EN FRUIT

In aansluiting op hetgeen ik de vorige maand reeds mededeelde betreffende de distributie van groente en fruit, deel ik thans nog mede, dat behalve de diabeteslijders ook de lijders aan spruw en coeliakie in aanmerking kunnen komen voor een toewijzing van fruit.

's-Gravenhage, 13 November 1945

C. BANNING,

geneeskundig hoofdinspecteur van de Volksgezondheid

OVERDRUKKEN VAN ENGELSCH EN AMERIKAANSCH BIOCHEMISCHE LITERATUUR

Ondergeteekende heeft zich als voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor Biochemie tot de directeuren der voornaamste biochemische laboratoria in Engeland en Amerika gewend met het verzoek hem een zoo volledig mogelijk stel overdrukken van tijdens den oorlog verschenen artikelen te zenden, teneinde deze in Nederland te laten circuleeren. Een lijst met de titels der tot dusver ontvangen overdrukken zal na aanvraag bij ondergeteekende aan belangstellenden worden toegezonden. Zij kunnen hem dan laten weten, welke nummers zij ter lezing wenschen te ontvangen. Er wordt verwacht, dat de terugzending zoo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na ontvangst, plaats heeft. Bij meer aanvragen voor één nummer tegelijk genieten de leden van de Vereeniging voor Biochemie den voorrang.

J. D. Meijerplein 3, Amsterdam-C.
19 November 1945

H. G. K. WESTENBRINK

CHONDRODERMATITIS NODULARIS CHRONICA HELICIS

Naar aanleiding van mijn mededeeling in het *N. T. v. G.* no. 9/10 1944, wil ik wat betreft de therapie, daaraan iets toevoegen:

De eerste patiënt heeft door een ongeval twee halswervels gebroken en dientengevolge een totale verlamming van armen en beenen gekregen. Na ongeveer vier maanden in een lus volgens GLISSON te hebben gelegen, bleek het euvel aan zijn oor volkomen genezen te zijn. De druk op die zijde blijkt dus de ontsteking te onderhouden (de vergelijking van CAROL en VAN HAREN met een likdoorn). Een geval van chondrodermatitis na *bevroering* is door diathermische coagulatie genezen. Voorts deelde collega KLEBER mij mede, dat hij in drie gevallen ruime exstirpatie had verricht zonder recidief; er is echter wel een leelijke, kleine misvorming overgebleven.

Omdat verschillende zalven, bestraling met radium, en zoo voort geen effect hebben en mutilatie het gevolg van ruime uitsnijding is, dient ligging op het gezonde oor te worden aanbevolen.

November 1945

K. A. ROMBACH

MYOCARDITIS DIPHTHERICA

Naar aanleiding van het artikel van collega STEENHUIS in Noodnummer XXVI zou ik evenals collega VAN DER WEY, in Noodnummer XXIX, eenige opmerkingen willen maken. Bij de gevallen van maligne keel-diphtherie hebben wij op de vrij groote diphtherie-afdeeling van het St. Franciscus Gasthuis te Rotterdam twee vormen leeren kennen met een slechte prognose (zie ook JOCHMANN-HEGLER 1.)

I. Peracuut verloopende gevallen met sterken burgemeestershals, bleeke gelaatskleur, onrust, frequenten pols en meestal verlaagden bloeddruk; dit kan zich in 24 uur ontwikkelen, of ook na een minder onrustbarend begin tot ontwikkeling komen als serumtherapie achterwege wordt gelaten. De patiënt overlijdt in den regel vrij plotseling binnen enkele dagen, zonder duidelijke verschijnselen van een hartaandoening. Ook worden vaak

1) JOCHMANN-HEGLER, *Lehrbuch der Infektionskrankheiten*. II druk. 1924.