


defecten goed overeenstemt. De pseudo-hypertrophieën komen bij deze aandoening namelijk niet vaak voor, terwijl het beloop niet sterk progressief is.

Tilburg, 14 Maart 1946

J. L. M. SINNIGE

EEN NIEUWE METHODE TER BEHANDELING VAN LAGE, GEDISLOCEERDE ONDERBEENFRACTUREN

De collega TORDOIR en MOEYS geven in dit *Tijdschrift*, No. 7/8, bldz. 138, een nieuwe methode aan ter behandeling van lage gedислоceerde onderbeenfracturen. Menig chirurg weet uit



eigen materiaal hoe moeilijk deze fracturen „ideaal” te reponeren zijn, zeker langs den conservatieven weg. Vele orthopaeden zien dan ook deze patiënten later terug met klachten, die voornamelijk ontstaan door het blijven bestaan na de repositie van de diastases der enkelvork, ook al is de as-stand van tibia en fibula goed gelukt. Nu schrijven de collegae TORDOIR en MOEYS „dat er geen goede operationele methode bestaat” en geven hun methode met centrale mergpen in fibula als ideaal aan.

Hoe zij hiermede de diastases der enkelvork, waar het op aankomt, opheffen is mij, en vermoedelijk ook anderen, niet duidelijk. De dislocatie der fractuurstukken kan wel er door worden opgeheven, maar zeker niet de diastase der enkelvork.

Een andere mijns inziens betere operationele methode hebben vooral de Fransche chirurgen JEANBREAU en LÉJARS aangegeven; de osteosynthese-methode volgens LAMBOTTE is nog doeltreffender. Hierbij worden à vue de tibia en fibula operatief gereponeerd. De tibia wordt gefixeerd met een metalen plaatje en schroeven, en de fibula met een of twee epiphysaire schroeven tegen de tibia gefixeerd, zoodat de enkelvork den oorspronkelijken anatomischen vorm krijgt en er later géén functioneele klachten ontstaan. Ik opereerde reeds verscheiden patiënten aldus met volledig goed anatomisch en functioneel resultaat. Zie bijgaande figuren met dezelfde fractuur als afgebeeld door de collegae TORDOIR en MOEYS volgens deze methode.

Eindhoven, 26 Februari 1946

B. VAN 'T HULLENAAR

BERICHTEN

BUITENLAND

ABESSINIË. — EEN GENEESKUNDIGE MISSIE. Vijf Zwitsersche artsen, vergezeld van twee verpleegsters, zullen op uitnodiging van de Abessijnsche regeering te Djimma de leiding van een ziekenhuis op zich nemen (*Schweiz. med. Woch.* 1946, blz. 144).

AFRIKA. — POLIOMYELITIS OP MAURITIUS. Gedurende de eerste vijf maanden van 1945 zijn er minstens 1018 gevallen van poliomyelitis voorgekomen onder de 42000 inwoners tellende bevolking von Mauritius. Het groote aantal slachtoffers onder de jonge kinderen en de betrekkelijk hooge cijfers in landelijke districten wijzen op de epidemische uitbreiding van een endemische ziekte (*Lancet*, 1945, blz. 782).

AMERIKA. — DE BORNHOLMSCHE ZIEKTE. Pleurodynia epidemica is een epidemische