

INGEZONDEN

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen.

EEN GEVAL VAN HET SYNDROOM VAN REITER

In aansluiting aan de mededeeling van de collegae PRAKKEN en HARTMAN (*N. T. v. G.* 1946 I-II, 13/14) deel ik hierbij de volgende historia morbi mede:

Mej. A., 18 jaar, roept op 17 Augustus 1945 mijn hulp in wegens koorts, pijnlijke oog en een pijnlijke knie. Objectief: beiderzijds conjunctivitis non purulenta; de rechter knie is rood, gezwollen en pijnlijk bij betasten. Patiënte zou ongeveer 4 weken geleden gedurende enkele dagen geleden hebben aan diarrhee, gepaard gaande met koorts en buikkrampen; ze kan zich niet herinneren, of er bloed bij de faeces was; ze had tevoren rauw fruit gegeten. Bij algemeen onderzoek werden verder geen afwijkingen gevonden.

Patiënte kreeg cibazol 4dd. 1 g gedurende 3 dagen, en bovendien 3 dd. 1 g salicylas natric. gedurende een week. Ze genas vlot: op 25 Augustus 1945 waren alle klachten en verschijnselen verdwenen. Bij navraag bleek, dat zij gedurende de eerste ziektedagen iets te frequente en pijnlijke mictie heeft gehad. Het zeer snelle en goedaardige beloop voorkwam het voorgenomen bloedonderzoek.

Naar aanleiding van dit geval kunnen wij opmerken:

1e. De diagnose: „syndroom van REITER” staat hier wel vast, zij het dan een bijzonder licht geval.

2e. Ook hier vinden wij diarrhee in de anamnese; bacillaire dysenterie is niet bewezen, doch gezien beloop en jaargetijde wel zeer waarschijnlijk.

3e. Voorzooover ik kon nagaan is dit syndroom-bij vrouwen zeer zelden gezien.

Amsterdam, 9 April 1946

J. A. DE JONG

BERICHTEN

BUITENLAND

AMERIKA. — VERGIFTIGING DOOR METHYLALCOHOL. Bij marinepersoneel in de Stille Zuidzee zijn 60 gevallen van vergiftiging door methylalcohol voorgekomen. Het chemicale, bestemd voor technische doeleinden, werd door de matrozen met vruchtensappen verdund, negentien patiënten zijn gestorven tengevolge van acidosis (oxydatie via formaldehyde tot mierenzuur). Aethylalcohol wordt als geneesmiddel aanbevolen (*Brit. med. J.* 1946, blz. 281).

— WAARDEERING VAN HET ATEBRINE. In den oorlog tegen Japan hebben de Amerikanen, bij gebrek aan kinine, de geneeskrachtige werking van het acridinederivaat atebriene bij malaria op hoogen prijs leeren stellen. Het voorkomt zelfs in een veel grooter percentage dan kinine het recidiveeren van de infectie.

Toen de nood aan den man kwam — 70 pCt. der troepen op de Salomoneilanden leden aan malaria — hebben de Japanners nog getracht het middel bij de Amerikaansche soldaten en matrozen in discredit te brengen door hun met uit vlieg machines geworpen pamfletten op den mouw te spelden, dat het atebriene de sexueele potentie aantast. Dit werd van Amerikaansche zijde prompt beantwoord met de ruime verspreiding van een caricaturaal prentje, voorstellende een sultan, die, te midden van zijn vrouwen, meende het pilletje juist bijzonder te moeten prijzen.

De aanmaak van atebriene steeg in de oorlogsjaren tot 250 millioen doses; in de Stille Zuidzee had iedere man een voorraad voor 30 dagen bij zijn uitrusting. Zonder atebriene, zoo zegt men thans, zou de slag in Azië niet zijn gewonnen (*Presse méd.* 1945, blz. 182).

BELGIË. — TUBERCULOSE IN OORLOGSTIJD. De sterfte aan tuberculose (alle vormen) bedroeg in 1930 91.3 per 10000 inwoners, daalde tot 68.2 in 1939 en steeg in 1941 tot