

Bij de klinische opleiding hecht hij veel gewicht aan de ochtendbijeenkomsten, waar de gevallen klinisch en anatomisch besproken worden in tegenwoordigheid van den geheelen geneeskundigen staf.

Bij de opleiding der verpleegsters wil hij minder theorie, en meer practijk, in dien zin, dat een leerling-verpleegster wordt toegevoegd aan een oudere zaalzuster, die haar in de practijk der verpleging inwijdt. Den ziekenhuisartsen wordt aanbevolen — in het belang der patiënten — de kennis der verpleegsters stelselmatig te onderhouden en uit te breiden en daartoe voortdurend practische demonstraties en ook excursies naar andere inrichtingen te organiseeren.

H. R. VAN DER MOLEN

INGEZONDEN

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen

DISTRIBUTIE VAN TEXTIEL TEN BEHOEVE VAN ZIEKEN

Volgens mededeeling van het Centraal Distributie Kantoor te 's-Gravenhage zijn er thans nieuwe voorschriften van kracht geworden voor de distributie van textielproducten. Hierdoor is het thans mogelijk, dat de betrokkenen wullen onderkleeding, voor zoover voorradig, kunnen aanschaffen op de geldige punten van de textielkaart, terwijl extra textielpunten niet meer voor dit artikel verstrekt kunnen worden.

Aanvragen om wollen onderkleeding, kunnen derhalve niet meer door de distributiediensten in behandeling worden genomen.

Hiermede *vervalt* dus mijn publicatie van *Januari 1946*.

L. A. VEEGER

*wnd. geneeskundig hoofdinspecteur
van de Volksgezondheid.*

's-Gravenhage, 11 Juli 1946

OLEUM CHENOPODII.

Naar aanleiding van de mededeeling van dr. HULST in het *N. T. v. G.* van 6 Juli 1946 betreffende *Oleum chenopodii*, moge ik mededeelen, dat ik dit middel steeds met zeer veel succes heb gebruikt.

Terwijl verschillende andere wormmiddelen dikwijls faalden komt dit naar mijn ervaring met *ol. chenopodii* practisch niet voor.

Naar schatting heb ik dit middel wel 20.000 maal verstrekt en ik heb nooit een onaangename bijwerking, behalve dan den smaak, waargenomen.

Ik heb den indruk, dat bij een juiste doseering van het middel geen kwaad is te duchten.

Zwartemeer, 13 Juli 1946

G. K. H. J. HOENDERS

OLEUM CHENOPODII

Naar aanleiding van het ingezonden stuk over *oleum chenopodii* van collega HULST (*N. T. v. G.* 90, III, 27, blz. 796) zou ik gaarne willen opmerken, dat ik in 1940 van de waarschuwing van prof. VAN LOOKEREN CAMPAGNE en prof. SCHÜFFNER goede nota had genomen en met aandacht gelet heb op ongewenschte bijwerkingen van dit geneesmiddel in de kinderpractijk in de tropen. Als leider van zuigeling- en kinderpoliclinieken, voor de bevolking bestemd, gaf ik het volgens de classieke doseering van SCHÜFFNER in alle gevallen van *ankylostomiasis*, al dan niet gecombineerd met *ascariden*, bij enkele gevallen van *anguillula stercoralis*, soms bij *ascariden*, nooit bij *oxyuren* of *trichocephalus*. Ook in de particuliere practijk — Europeanen en Chineezen — werd het nogal eens gebruikt, maar mij persoonlijk is geen enkel geval van intoxicatie van beteekenis bekend. Op de policlinieken werd de *chenopodium*-olie altijd door de mantri's gegeven, die ook zorgden voor toediening van het laxans (meestal *sulfas magnesicus*, soms *ol. ricini*). Wanneer herhaling van de kuur wenschelijk was, zorgden wij voor een interval van 6—8 weken tusschen twee kuren.

Het kwam naar mijn weten niet voor in Soerabaja, dat *ol. chenopodii* zonder recept