

INGEZONDEN

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen.

HET NOODFORMULARIUM

Daar de ergste noodtoestand op het gebied der geneesmiddelenvoorziening als geëindigd kan worden beschouwd, acht ondergeteekende de toepassing van het Noodformulairium (N. F.), uitgegeven in Februari 1945, niet meer noodzakelijk.

Amsterdam, 26 Augustus 1946

J. W. BIRZA
directeur van het Rijksbureau
voor genees- en verbandmiddelen

INSPUITINGEN VAN LEVEREXTRACT BIJ ZWANGEREN

Naar aanleiding van de vraag, door prof. VAN LOOKEREN CAMPAGNE in zijn klinische les gesteld, of insputingen van leverextract bij zwangeren, die reeds kinderen met morbus haemolyticus foetalis ter wereld brachten, de vooruitzichten voor de kinderen kunnen verbeteren, kan ik mededeelen, dat ondanks 2 cm³ pernaemon forte per week gedurende de laatste 8, resp. 10 weken ante partum gegeven, een aan diabetes lijdende vrouw — die na 3 normale partus reeds 3 kinderen met morbus haemolyticus foetalis had gehad — in 1933 een kind met den icterus-gravis-vorm en in 1935 een gemacereerd kind van 7700 g, dat sterk hydropisch was, ter wereld bracht. De mogelijkheid, dat een vroeger ingestelde levertherapie (bijvoorbeeld van de 20ste week af) en misschien ook een minder sterk gezuiverd praeparaat meer succes had kunnen opleveren, blijft natuurlijk open.

Lichtenvoorde, 19 Augustus 1946

W. J. M. A. HARDY

TONGABSCES

Nog een praktijkervaring: Een boer verwondde zijn tong met den steel van zijn kalken tabakspijpje. De tong zwol zoodanig, dat de plaatsruimte in den mond haar slechts gedeeltelijk kon herbergen. Er waren een flinke klierzwelling onder de kin en subfebrile koorts.

De therapie bestond uit vier oppervlakkige lengte-scarificaties en bedruipen alle 2 uur met een 0.25 pCt. oplossing van permang. kalic. De man voelde spoedig verlichting van zijn benauwden toestand en was al gauw genezen.

Veghel, 21 Augustus 1946

J. H. VERBEEK

FREQUENTIE VAN COLONINVAGINATIES DOOR MALIGNIE GEZWELLEN

In zijn artikel in het *N. T. v. G.* van 20 Juli l.l. deelt collega KWEEKEL mede, de frequentie van de colon-coloninvaginatie door kanker niet in de literatuur te hebben aangetroffen. Uit enkele gepubliceerde statistieken is deze toch wel bekend.

ELLIOTT en CORSCADEN 1) vonden op 300 invaginaties bij volwassenen 18 maligne gezwellen als oorzaak (6 pCt.). KASEMEYER 2) verzamelde 284 gevallen van invaginatie door gezwellen. Hierbij waren 48 maligne colontumoren. Het aantal invaginaties door gezwellen veroorzaakt wordt in de groote statistiek van OBST 3) op 3.5 pCt. berekend van het totale aantal invaginaties. De maligne gezwellen van het colon zouden, volgens

de reeks van KASEMEYER, dus in $\frac{48}{284} \times 3.5$ pCt. = 0.7 pCt. van alle invaginaties de oorzaak der instulping zijn. PERRIN en LINDSAY 4) beschreven 400 invaginaties, 7 maal was hierbij een carcinoom oorzaak van een dikken-darminvaginatie (1.7 pCt.).

Op 252 invaginaties, in 30 jaar in de Groningsche Heelkundige Cliniek gezien, werden 4 colon-coloninvaginaties aangetroffen, die door maligne gezwellen waren veroorzaakt (1.5 pCt.). Bij deze 252 patiënten waren 46 volwassenen, de genoemde 4 coloninvaginaties kwamen alleen bij deze leeftijdsgroep voor (8.7 pCt.).

1) *Ann. of Surg.* blz. 69, 1911.

2) *Dtsche Zeitsch. f. Chir.* blz. 205, 1912,

3) *Ergebn. der Chir. und. Orthop.* 1937.

4) *Brit. Journ. of Surg.* blz. 46, 1921.