

4. Het onderzoek van patiëntenserum op antilichamen tegen pokvirus heeft pas zin na een ziekte duur van ongeveer een week en dan slechts indien de patiënt niet kort geleden (6 maanden) is gevaccineerd. Ook hier is de complementbindingstechniek de aangewezen methode en wel tegen een uit zekere pokpuisten verkregen pokkenantigeen of tegen een vaccinia-antigeen verkregen uit bij konijnen opgewekte huidlaesies.

D. C. CANNE

## LITERATUUR-OVERZICHTEN



### WEEKBLADEN

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, DL 134, No. 15. L.I. DUBLIN and M. SPIEGELMAN. *The longevity and mortality of American physicians.* — Een arts van 25 jaar heeft in Amerika gemiddeld nog  $43\frac{1}{2}$  jaar te goed, een vrouwelijk collega zelfs 47 jaren. Er is geen treffend verschil met andere blanken. Wel zijn de doodsoorzaken iets anders verdeeld: voor artsen lager voor infectieziekten, operaties en ongevallen, hoger daarentegen voor vaat- en hartaandoeningen. Voor ziekten van de kransslagaderen van het hart is de verhouding tot andere mannen van dezelfde leeftijd zelfs als 1.8 : 1.

R. M. LEVERTON and G. CLARK. *Meat in the diet of young infants.* — Mengaf aan 18 fles-kinderen van de zesde levensweek af per dag 27 g op een bepaalde wijze bereid en zacht gemaakt vlees. Men meende hiervan alleen maar gunstige resultaten te zien, vooral ten opzichte van het bloed.

A. C. CURTIS and J. N. GREKIN. *Histoplasmosis.* — Bespreking van 3 gevallen van histoplasmosis, een ziekte, die in de centrale staten van de U.S.A. nogal eens schijnt voor te komen. Soms staan verschijnselen van huid en slijmvliezen op de voorgrond, meestal echter schijnen de luchtwegen of de spijsverteringsorganen de plaatsen te zijn, van waaruit de schimmel (*histoplasma capsulatum*) in de organen dringt.

P. OLITZKY and J. CASALS. *Neutralization test for diagnosis of human virus encephalitides.* — Men kan een verdacht serum toevoegen aan een bekende hoeveelheid virus. Dit mengsel kan men, nadat het een tijdlang onder bepaalde voorwaarden van temperatuur enz., heeft gestaan, inspuiten bij bepaalde proefdieren en dan wacht men maar af, of een virus effect heeft of niet. In het laatste geval is het virus geneutraliseerd. Men kent nu verschillende virussoorten, die encephalitis verwekken. Hier wordt besproken, hoe men deze neutralisatie-reactie kan gebruiken.

B. R. KIRKLIN and E. L. GILBERTSON. *Roentgenograms of thorax that suggest carcinoma of stomach.* — Bij de gewone doorlichting of photographie van de thorax lette men op de vorm van het met lucht gevulde bovenste deel der maag; soms kan men hier een carcinoom ontdekken.

H. CH. FRANKLIN. *Prophylaxis against ophthalmia neonatorum.* — Een vergelijking van de resultaten, verkregen met het indruppelen van penicilline of zilvernitraat in de ogen van pasgeborenen valt uit ten gunste van het penicilline. Dit is minder gevaarlijk en werkt beter.

J. J. KAMPS

## INGEZONDEN

*De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zo nodig enige bekorting aan te brengen*



### HET RIJKSBUREAU VOOR GENEES- EN VERBANDMIDDELEN

Het Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen vestigt er de aandacht op, dat het bij herhaling voorkomt, dat inzendingen voor herbevoorradingen, omwisseling, splitsing of anderszins van distributiebonnen, vergunningen en andere waardepapieren aan het Bureau niet op verantwoorde wijze plaats vinden.

In dit verband wordt gewezen op art. 6 van de Geneesmiddelenbeschikking 1947 d.d. 11 Januari 1947, luidende:

„Ondernemingen, gevestigde apotheken, apotheekhoudende geneeskundigen, gevestigde dierenartsen en ziekeninrichtingen zijn verplicht bij het beheer en de be- of verwerking van geneesmiddelen en het beheer van de ter uitvoering van deze beschikking uitgereikte bescheiden, de nodige zorg aan te wenden.”

Gelet op de inhoud van dit artikel alsmede op het bepaalde in circulaire no. 766 punt 9 en no. 783 punt 4 wordt verzocht, alle bovenomschreven distributie-papieren aangetekend aan het R.G.V. in te zenden.

In verband met het bovenvermelde kan de Directie van het R.G.V. voor *niet* aangetekende zendingen geen enkele verantwoording dragen.

Geleidenlijsten kunnen separaat per post worden verzonden.

Amsterdam, 17 December 1947

*De Directie van het Rijksbureau  
voor Genees- en Verbandmiddelen  
B. VERKAAIK, wnd. dir.*

#### AAN DE ARTSEN IN NEDERLAND

Geachte Collegae,

Zijne Excellentie de Minister van Sociale Zaken heeft mij opgedragen een onderzoek in te stellen naar de kortegolven-stralenbehandeling, welke door dr. J. SAMUELS te Amsterdam is aangegeven en welke door hem en een enkele andere arts wordt toegepast bij patiënten lijdende aan een aantal ziekten.

Indien de bewering van dr. SAMUELS juist is, dat zieken, in het bijzonder lijdens aan kwaadaardige gezwellen, met deze behandeling kunnen worden genezen, is het duidelijk dat aan de mensheid een onschatbare dienst zou zijn bewezen.

Indien deze bewering niet juist is, is het in hoge mate gewenst dit zo spoedig mogelijk vast te stellen.

Teneinde de mij opgedragen taak te kunnen vervullen is de hulp van velen Uwer onontbeerlijk. Ik doe een beroep op U mij deze hulp te verlenen en vertrouw dat U, wegens het grote belang dezer aangelegenheid, ten volle bereid zult zijn mij ter zijde te staan.

Uw medewerking wordt gevraagd op drieërlei wijze:

1. Door, op mijn verzoek, inlichtingen te verstrekken over een patiënt.
2. Door, op mijn verzoek, een onderzoek in te stellen naar de gezondheidstoestand van een patiënt en over het resultaat van dit onderzoek een verslag aan mij uit te brengen.
3. Door mij, uit eigen beweging, alle inlichtingen te doen toekomen die het vervullen van mijn taak kunnen bevorderen.

's-Gravenhage, 23 December 1947

*De Voorzitter van de Gezondheidsraad,  
BRUTEL*

#### ALLERGISCHE VERSCHIJNSELEN NA HET GEBRUIK VAN EEN SULFANILAMIDEPRAEPARAAT

Een man van 45 jaar, een half jaar geleden geopereerd wegens een ulcus pepticum jejuni, door omstandigheden (totale obliteratie van het peritoneum der bovenste buikhelft) niet met de gebruikelijke resectiemethode volgens BILLROTH II, doch met een gastro-enterostomia antecolica anterior, met BRAUN'S anastomose, kreeg wegens een uitgebreide folliculitis barbae, irgafeen (methyl-benzoyl-sulfonamide).

De gebruikte hoeveelheid ledroeg gedurende de eerste dag tweemaal een gram, en de tweede dag eenmaal een halve gram. Reeds de tweede dag ontstond in het gelaat, aan de handen, ook aan de handpalmen, snel zich uitbreidend over het gehele lichaam, uitgezonderd aan de voetzolen, een eerst vlekkelig, daarna klein-papuleus en op sommige plaatsen vesiculeus uitslag (zeer kleine, helder vocht bevattende blaasjes). Er bestond tevens een algemene pruritus cutaneus. Het bloed bevatte slechts 4 pCt. eosinophile leucocyten.