

Volgt men hier de **SCHOEMAKER**-techniek wat betreft de anastomose, dan zien wij, ook volgens mijn ervaring, vele mislukkingen. Nu moeten wij niet de **BILLROTH-I** methode verwerpen, maar wij moeten de anastomose zo maken, dat er ook hier een goed stoma ontstaat.

Bij mijn eigen techniek 1) komt de anastomose in de pars descendens, waar de omstandigheden voor een goed stoma gunstig zijn, terwijl de pars superior duodeni wordt gemobiliseerd en gerecedeerd tot voorbij de knie (de ombuiging van de pars superior naar de pars descendens van het duodenum).

Wat betreft de te kleine resectie: ik moet toegeven, dat de resectie bij de **BILLROTH I**-operatie nooit groter moet zijn dan die bij de **BILLROTH II**-methode.

Eindhoven, 23 Februari 1948

A. D. J. M. VERBEEK

NOTA'S VOOR GENEES- EN VERBANDMIDDELEN

A. Aangezien volgens de geldende bepalingen nota's over het jaar 1947 uiterlijk op 31 Mei 1948 afgedaan moeten zijn, is het noodzakelijk, dat nog niet ingediende vorderingen genees- en verbandmiddelen betreffend, welke zijn afgeleverd aan personen, rechthebbend op verstrekking van medicamenten op rijkskosten, in de periode van 1 Januari tot en met 31 December 1947, *uiterlijk 1 Mei 1948* zijn ingezonden aan de Chef Militair Pharmaceutische Dienst te Amsterdam, Sarphatistraat 110A.

Amsterdam, 2 Maart 1948

G. G. J. LE GRAND

BERICHTEN



BUITENLAND

BELGIË. — **EEN LEERGANG VOOR ARTSEN IN DE CONGO.** Een Belgisch chirurg, prof. **NEUMAN**, heeft in opdracht van de Minister van Koloniën van April tot Augustus een rondreis per vliegtuig gemaakt, teneinde in Léopoldville, Elisabethville, Usumbara, Costermansville, Stanleyville en Coquilhatville ten behoeve van de in de kolonie werkzame geneesheren voordrachten en demonstraties te houden. Een belangwekkend verslag van zijn ervaringen verschijnt in *Bruxelles médical* (329, 1948); hij legt de nadruk op het tekort aan artsen, verplegers en verpleegsters.

ENGELAND. — **DE UITSLAG VAN HET PLESBISCIET.** De *British medical Journal* (no. 4546) wijdt een uitvoerige beschouwing aan de uitkomsten van het op 31 Januari gehouden plebisciet. Het formulier werd aan 51.042 geneeskundigen toegezonden en door 43.013 beantwoord. Van deze laatsten bleken 38.534 niet in te stemmen met de National Health Service-wet in haar tegenwoordige gedaante. Van hen die rechtstreeks bij de wet zullen zijn betrokken — specialisten en huisartsen — verklaarden 22.106 geen dienst te willen doen onder de wet „in its present form”, tegenover 3.471 die hiertoe wel bereid zijn. Blijven de onwilligen tot 5 Juli bij hun mening en rekt men de niet-stemmers tot de willigen, dan zal minister **BEVAN** op de fatale datum slechts 3560 „general practitioners” en 971 specialisten tot zijn beschikking hebben voor de geneeskundige voorziening ten behoeve van 47 miljoen.

FRANKRIJK. — **HET ONDERZOEK VAN SERUM BIJ LUES.** De Société Française de Dermatologie et de Syphiligraphie heeft het nodig gevonden nog eens nadrukkelijk te verklaren, dat het laboratoriumonderzoek van luetisch serum niet als beslissend mag worden aanvaard. Een positieve serologische uitkomst is evenmin gelijk te stellen aan syphilis als een negatieve uitkomst wijst op afwezigheid of genezing van syphilis (*Paris médical*, no. 4, 1948).

1) *Maagchirurgie*. L. J. VEEN's Uitgeversmaatschappij N.V.