

lager dan bij zieken, die volgens een andere behandelingstechniek werden ingespoten.

Voorts bleek bij ons eigen materiaal, dat het streptomycine-gehalte van het lumbale vocht na een intralumbale injectie met 100 mg vaak vele dagen 10 E. per cm<sup>3</sup> of meer bedraagt. Deze bevinding gaf aanleiding tot het stellen van de tot nu toe nog niet opgeloste vraag, of dagelijkse intralumbale inspuitingen wel noodzakelijk zijn. Mocht men op den duur er toe kunnen besluiten, de intralumbale injecties minder frequent te geven, dan bestaat de mogelijkheid, dat het aantal kunstmatig verwekte arachnoiditides (soms dwarslaesies), die in een aantal gevallen spontaan kunnen verdwijnen, tot een minimum beperkt worden.

Amsterdam, 12 April 1948

J. E. MINKENHOF

### DE VENERISCHE ZIEKTEN IN HET LEGER

Naar aanleiding van het bovengenoemde artikel van collega VAN DER VEEN moge ik opmerken dat tabel V een onjuiste interpretatie in de hand werkt. Het zou namelijk juister zijn de samenstelling van het leger ook in procenten uit te drukken naast de percentages van het totale aantal aangegeven ziekten in de verschillende beroepen. Maar daarbij zou dan ook de samenstelling van de bevolking moeten worden vermeld. Pas dan mag men conclusies trekken uit de bedoelde tabel. Om een voorbeeld te geven (met overigens fictieve cijfers):

20 pCt. der lijdens aan geslachtsziekten zijn werkzaam in zelfstandige beroepen.					
bv. 10 pCt. van het leger	„	„	„	„	„
„ 15 „ van de bevolking	„	„	„	„	„

Amsterdam, 18 April 1948

P. J. W. M. SCHILLEMANS,  
*Reserve-Officier van gezondheid  
der 2de klasse*

## BERICHTEN



### BUITENLAND

**DUITSLAND.** — **ABORTUS.** De hoge cijfers van abortus leidden tot gedachtenwisselingen over de kunstmatige onderbreking van de zwangerschap als strafbare handeling, afgezien van de medische aanwijzingen. Sociale indicaties — gebrek aan voedsel en woonruimte — worden alleen in de Russische zone aanvaard. De sociale nood moet dan door een commissie zijn vastgesteld, de vrucht mag niet ouder dan drie maanden zijn en de vrouw moet over het aan de operatie verbonden gevaar zijn ingelicht. In de Amerikaanse zone kan deskundige onderbreking van de zwangerschap worden toegestaan, indien verkrachting is bewezen. In de andere zones acht men hetgeen tot nu toe als „bewijs” diende onvoldoende. Een eugenetische indicatie werd zelfs in de HITLER-jaren niet aanvaard. Behalve de dominant erfelijke chorea van HUNTINGTON (50 pCt. kans, indien één der ouders ziek is) kent men slechts zenuwziekten met geringer kans dan 50 pCt. Schizophrenie van één der beide ouders betekent 10 pCt., van beide ouders 53 pCt. (*J.A.M.A.*, deel 136, 708, 1948).

**FRANKRIJK.** — **HONDSVOLHEID OP CORSICA.** De geallieerde troepen brachten de lyssa naar Corsica; men meent, dat de ziekte thans in ernstige mate onder de vossen op het eiland is verspreid. Dit betekent, behalve voor de honden, een gevaar voor het vee, dat in grote vrijheid wordt geweid. In 1946 kwamen 121 mensen onder behandeling; bij de behandelenden kwamen geen ziektegevallen voor, maar het staat niet vast hoevelen van hen door dolle dieren zijn gebeten (*Bull. Ac. nat. med.*, 128, 1948).

**VERENIGDE STATEN.** — **BESTRIJDING VAN BALDADIGHEID EN KINDERMISDADEN.** Te Washington ontstond uit een vriendschappelijk onderhoud van een politieagent met vier jongens, die bezig waren elektrische lampen stuk te