

## BEHANDELING VAN BRANDWONDEN

Naar aanleiding van het artikel van collega DU MARCHIE SARVAAS (*N.T.v.G.* IV, 3073, 1948), moge een waarschuwing tegen het geven van sulfonamides in zalven, enz. niet achterblijven, nu overal toestanden van allergische reacties zijn waargenomen. Behalve aan de zeer onaangename bijwerking stellen wij onze patiënten bloot aan extra grote gevaren wanneer het er op aankomt sulfonamides in grote hoeveelheden toe te dienen. Daar in ons *Tijdschrift* bij herhaling is gewezen op de gevaren verbonden aan het toedienen van sulfoverbindingen, hoede men zich ervoor door locale therapie het risico nog meer te vergroten.

Hilversum, 4 October 1948

D. P. R. KEIZER

## MAZELEN VOOR DE TWEEDE MAAL

Het is merkwaardig, dat de meeste autoriteiten op paediatrisch gebied de mogelijkheid van „voor de tweede maal mazelen” nog in discussie brengen (zie D. P. R. KEIZER, *N. T. v. G.* blz. 3118, 2 October 1948). Iedere huisarts met enkele jaren praktijk komt dit af en toe bij de aan hem toevertrouwde kindershare tegen en is van deze mogelijkheid ten volle overtuigd — een fait accompli.

In de huisartsen-studiekring, waar ik in mijn huisartsenperiode deel van uitmaakte, kwamen dergelijke gebeurtenissen tijdens mazelen- of kinkhoest-epidemieën geregeld ter sprake, waarbij de diagnose aan geen twijfel onderhevig was. Mijn indruk, dat in deze gevallen veelal het eerste ziek-zijn in het eerste levensjaar valt, zou men kunnen controleren, door een enquête onder een groot aantal huisartsen te houden.

Het eerste ziek-zijn kan klinisch een lichte indruk maken, vergeleken met de tweede maal, doch ook het omgekeerde komt voor.

Hilversum, 4 Oct. 1948  
Sanatorium „Zonnestraal”

P. G. OP DE COUL

## DE PRIJS VAN SULFAPRAEPARATEN

Naar aanleiding van het art. van H. M. CLAASSEN in het *N. T. v. G.*, blz. 3021 vestig ik er de aandacht op, dat percoccide thans veel duurder is dan sulfadiazine. Per 1 October zijn de fondsprijzen (dat is inkoop + 10 pCt.!) als volgt:

percoccidepoeder	10 g	f 1.98
sulfadiazinepoeder	10 g	f 0.89
percoccidetabletten	20 st.	f 2.20
sulfadiazinetabletten	20 st.	f 1.31.

Arnhem, 6 October 1948

H. WITTEVEEN, apotheker

## PERNAMON FORTE BIJ HERPES ZOSTER

Ongeveer 1½ jaar geleden behandelde ik een patiënt van 81 jaar, lijdende aan herpes zoster, gelocaliseerd in het gebied van Th. 10. Er waren sterke huidverschijnselen en patiënt had veel pijn, welke bleef voortduren, ook nadat de herpes verdwenen was. Deze pijn was zo hevig, dat de algemene toestand van de patiënt sterk achteruitging, mede door gebrek aan slaap. Pituïtrine durfde ik niet in te spuiten wegens een sterke arteriosclerose en de hoge tensie van de patiënt. Collega MANUS (Medische Dienst, Organon) vestigde mijn aandacht op een mededeling van H. DICKIE in het *Brit. med. J.* 1945, II, No. 4413, 171, waarin deze beschrijft hoe hij min of meer bij toeval een patiënt met dermatitis herpetiformis behandeld had met 4 cm<sup>3</sup> leverextract, met zeer goed resultaat. Hij had nadien nog een tiental patiënten op dezelfde wijze behandeld en steeds was het resultaat zeer gunstig geweest.

Ik heb mijn patiënt 4 cm<sup>3</sup> pernaemon forte intramusculair toegediend, waarna binnen 24 uur de pijn vrijwel verdwenen was. Ik heb hem in de volgende dagen nog 2 keer 2 cm<sup>3</sup> ingespoten. Patiënt heeft sindsdien geen pijn meer gehad.

Nadien was ik in de gelegenheid nog 15 patiënten, lijdende aan herpes zoster,