

Patiënte is een stevig gebouwde gezonde vrouw, met een normaal mond-slijmvlies. Als therapeuticum heb ik ook eerst borax-glycerini gebruikt, doch zonder succes. Een ander penseelvocht hielp al evenmin. Tenslotte ben ik overgegaan tot verwijdering van het haar met de scherpe lepel. Hierbij moest ik wegens kokhalsreflexen en kleine bloedingen in 3 zittingen het haarbeslag verwijderen,

Nadat de tong geheel afgekrabd was, had hij weer het normale aspect.

Bedoeling van deze regelen is te vermelden, dat de therapie van collega PLOEM stellig niet universeel is en zelfs dat *mechanische* verwijdering de enige oplossing is.

Amsterdam, 10 October 1948.

H. W. WELVAART

De discussie is thans gesloten.

REDACTIE

DE BEHANDELING VAN ANGINA AGRANULOCYTYCA

Naar aanleiding van de mededeling van dr. D. L. HULST (*N. T. v. G.* No. 41, 1948) het volgende:

Een week voor de opneming in het Gemeenteziekenhuis te Dordrecht (internist dr. BROEKMEYER) werd ik geroepen bij mevr. A., geboren 10 October 1889. Zij was ziek en koortsig en had keelklachten. De keel was rood, het slijmvlies was algemeen gezwollen. Er was geen beslag te zien. Ook later verscheen dit niet. Sulfapraeparaten hadden geen invloed op de koorts die hoog bleef. De toediening van diphtherieserum hielp evenmin (10.000 I.E. BURROUGHS WELLCOME). Toen rees het vermoeden van agranulocytose in verband met pyramidon-gebruik (3×300 mg per dag) voor een reumatische knie-aandoening. Bloedonderzoek: bezinkingssnelheid (WESTERGREN) 110 mm na 1 uur; leucocyten 1800; differentiële telling: 87 pCt. lymphocyten. Urine: alb. ++; suiker —; sediment 1 tot 2 leucocyten per gezichtsveld. De patiënte werd in het ziekenhuis opgenomen.

Bij het ontslag schreef dr. BROEKMEYER: mevr. A werd opgenomen met agranulocytose. Bij opneming 2000 leucocyten met 3 pCt. segmentkernige, hetgeen later nog daalde tot 2 pCt. Patiënte is uitsluitend behandeld met penicilline. Bij ontslag werden 8400 leucocyten geteld, waarvan 53 pCt. segmentkernige.

Zwijndrecht, 11 October 1948.

W. G. P. DE RAADT

BERICHTEN



BUITENLAND

WERELDBERICHTEN. — DE WERELDVERENIGING VAN ARTSEN. De World Medical Association heeft in September te Genève vergaderd. Dr. CHARLES HILL, secretaris van de British Medical Association, is tot voorzitter voor het jaar 1949—1950 benoemd. De volgende vergadering zal over een jaar te Londen worden gehouden. Men besloot tot de uitgave van een *W. M. A. Bulletin*, onder redactie van dr. MORRIS FISHBEIN, redacteur van de *Journal of the American Medical Association* (Chicago).

FINLAND. — DE ZIEKTE VAN REITER. De *Acta Medica Scandinavica* maken (als Supplementum CCXII tot Volumen CXXXI, 1948) een studie openbaar van 344 lijders aan de ziekte van REITER, in de jaren 1943—1946 in Finland waargenomen. De meeste gevallen behoorden tot een FLEXNER-dysenterie-epidemie, die gedurende de oorlogsomstandigheden in 1944 op de Karelische Isthmus heerste. In 70 pCt. der gevallen was de trias (verschijnselen van gewrichten, ogen en urethra) volledig. 10 pCt. der zieken waren vrouwen, de jongste zieke was een knaapje van 2 jaar. De ziekte zou voor de eerste maal vermeld zijn door CAELIUS AURELIANUS in het begin der vijfde eeuw (Rheumatismus intestinalis cum ulcere). Vóór REITER (1916) beschreven reeds MARKWALD (1904) en SINGER