

De resultaten van VAN DONGEN zijn bijzonder fraai. Zijn materiaal is echter met dat van HOYNG niet te vergelijken, daar maar een klein deel een volledige exstirpatie betreft (corpus- en cervixcarcinoom), en dit moeten wij toch met de vaginale hysterectomieën vergelijken. En hoe staat het met de klinische operabiliteit? Als VAN DONGEN alleen de gunstige gevallen opereert, zal dit zijn invloed op de statistiek zeker doen gelden. VAN BOUWDIJK BASTIAANSE opereerde slechts één patiënte van 84 jaar niet, wegens haar slechte algemene toestand (*N. T. v. G.* 91, 3588, 1947). En zijn uitkomsten behoren tot de beste ter wereld (primaire mortaliteit 0 pCt., 5-jaars genezing 75 pCt.). Bij de SCHAUTA-operatie zijn deze getallen 0 pCt. (laatste 224 gevallen) en 51.4 pCt.

Het schikt dus nogal met de vaginale techniek . . mits men indicatie en techniek kent!

Delft, 23 December 1948

J. H. F. BAARS,
vrouwenarts

BRIEFWISSELING

Het is ons helaas gebleken, dat een aantal exemplaren van no. 52, 1948, plus het register 1948 door onvoldoende verpakking het adres heeft verloren en als onbestelbaar door de post is teruggezonden. Abonnés, die dit nummer niet hebben ontvangen, wordt verzocht zulks aan de uitgevers kenbaar te maken.

REDACTIE

BERICHTEN



BUITENLAND

WERELDBERICHTEN. — ENTOMOLOGISCH ONDERZOEK IN HET BELANG VAN DE VOEDSELVOORZIENING. Ter gelegenheid van een bijeenkomst van de Internationale Vereniging van Biologische Wetenschappen te Stockholm hebben entomologen van tien landen een resolutie gezonden aan Unesco en F.A.O. betreffende de noodzakelijkheid van fundamenteel onderzoek in zake de biologische bestrijding van ziekten der voor de voedselvoorziening belangrijke gewassen. Zij zijn van mening, dat insectenplagen op den duur door aankweking van de natuurlijke vijanden der insecten beter worden bestreden dan door de kostbare, voor mens, dier en plant niet ongevaarlijke insecticida (*Lancet*, II, 994, 1948).

DENEMARKEN. — VRIJWILLIGE CASTRATIE. Sedert de invoering van de desbetreffende wet zijn in de loop van tien jaar 161 personen, veroordeeld wegens seksuele misdrijven, gecastreerd. In alle gevallen geschiedde de operatie op verzoek van de betrokken patiënten. Bij een viertal volgde recidief (*Proc. Royal Soc. of Med.*, 768, 1948).

ENGELAND. — EEN AUSTRALISCHE TYPHUSBACIL. Men is in Engeland een typhusbacil op het spoor, ingevoerd door patiënten, die op reis van Australië naar Engeland ziek zijn geworden. De bacil is met behulp van een voor het type specifieke bacteriophage herkenbaar. Aan geneeskundigen, die lijders aan febris typhoidea behandelen, wordt verzocht materiaal in te zenden aan de National Public Health Laboratory Service (*Med. Off.*, 260, 1948).

— GASTRO-ENTERITIS BIJ JONGE KINDEREN. Een „flying squad” houdt zich gereed voor onderzoek van gastro-enteritis-epidemieën. Het groepje onderzoekers heeft zijn hoofdkwartier in het Hospital for Sick Children, Great Ormond-street, Londen (*Med. Off.*, 267, 1948).

— SLACHTOFFERS VAN RAUWE MELK. Blijkens een mededeling van Minister BEVAN in het Parlement sterven er jaarlijks ongeveer 450 kinderen in Engeland en Wales aan bovine tuberculose; rauwe melk is gewoonlijk de bron van besmetting (*Med. Off.*, 268, 1948).