

maar eenvoudig om met kennis van zaken met onze afnemer (de redactie van het *Pharm. Wkbl.* tekent hierbij aan, dat de heer VERMET blijkbaar de ondeskundige patiënt bedoelt) eens te praten, welk middel de hoofdwering heeft. Dit geeft vertrouwen en daar gaat het om in het gehele leven". Ook meent de heer VERMET, dat „men gerust kan aannemen, dat haast alle (middelen) een goede ondergrond hebben (? Red. *Ph. Wkbl.*) en in de practijk wel degelijk als geneesmiddel voor de aangegeven kwalen een gunstig effect hebben gehad". „Alle medicijn van welke aard ook naar de apotheek; dat moet onze leuze zijn".

E. SLUITER

INGEZONDEN

Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten



DODELIJKE VERGIFTIGING MET ANTALLERGAN-TABLETTEN

Naar aanleiding van een recent vergiftigingsgeval, waarbij een kindje van 3 jaar ondanks getroffen voorzorgsmaatregelen uit een buisje Antallergan pro Infantibus een tiental tabletten tegelijk innam met dodelijk gevolg, moge artsen en apotheek-personeel worden verzocht om bij voorschrijven resp. afleveren van phenergan en antallergan ten behoeve van volwassenen en kinderen te wijzen op de noodzakelijkheid deze aantrekkelijk er uitzierende dragées zodanig op te bergen, dat kinderen ze niet kunnen bemachtigen. De fabrikant plaatst weliswaar de laatste tijd een soortgelijke waarschuwing op de verpakking, maar bij het aanbrengen van het etiket voor het gebruik, wordt deze waarschuwing onleesbaar, met kans op noodlottige gevolgen.

Rotterdam, 12 Februari 1949

J. J. VAN DE VELDE, arts
dr. P. H. BRANS, apotheker

BEHANDELING VAN ONTSTOKEN WONDEN

Naar aanleiding van vraag No. 8 in *N.T.v.G.*, blz. 342, 1949, zou ik de aandacht willen vestigen op H. J. COHEN's artikel over behandeling van abscessen (*J.A.M.A.*, 1948, No. 137, blz. 1531).

In het kort bestaat de behandeling uit: algemene penicilline-therapie tot de abscessen gelocaliseerd zijn, bij duidelijke fluctuatie punctie en vervanging van de afgezogen hoeveelheid etter door een zelfde hoeveelheid penicilline (per cm^3 25.000 Eenh.). De behandeling behoeft niet te worden herhaald.

Voordelen zouden zijn: snelle genezing zonder litteken en gemakkelijke nabehandeling (geen verbandwisseling).

In verband hiermede zou naar mijn mening de methode in punt 1 van genoemde vraag zeker overweging verdienen en zou het in punt 5 aangegevene niet te optimistisch zijn.

De bovenbeschreven methode heb ik in één geval reeds toegepast, echter met weglating van de algemene penicillinebehandeling, aangezien het een enkel abces was; het resultaat was zeer bevredigend.

Utrecht, 7 Febr. 1949

F. VERSNEL
Off. v. gez. 1e kl. K.N.I.L.

BERICHTEN

★ BUITENLAND

WERELDBERICHTEN. — INTERNATIONAAL CONGRES VOOR OPHTHALMOLOGIE. Het XVIe internationale congres van oogheekundigen is bestemd 17—21 Juli 1950 te Londen bijeen te komen onder voorzitterschap van Sir STEWART DUKE-ELDER. Hoofthemata zijn: 1e. De betekenis van het sympathische stelsel bij het ontstaan van vasculaire hypertensie en zijn invloed op het oog.