

waarschijnlijkheidsdiagnose werd dan ook gesteld op „rheuma”, mede op grond van de anamnese, volgens welke de knaap was ziek geworden in aansluiting aan een fietstocht tegen sterke wind in, waarbij hij zeer veel kou had geleden.

Tot mijn ontsteltenis hoor ik twee dagen later, dat ons patiëntje plotseling is overleden. Terwijl tevens is uitgekomen, dat de jongen vóór zijn fietstocht in het ijskoude water was geraakt door het omslaan van zijn kano. Daar hem dit varen door zijn ouders uitdrukkelijk was verboden, had hij er ook niet over durven spreken en was hij blijven rondlopen.

In het boven aangehaalde artikel wordt de aandacht gevestigd op de grote invloed van angst en psychische depressie bij het tot stand komen van ziekteverschijnselen na koudetraumata. Het wil ons voorkomen, dat ook in onze waarneming deze factor betekenis heeft gehad.

Rotterdam, 5 Maart 1948

A. G. J. HERMANS

MECONIUMHOUDEND VRUCHTWATER. OCCLUSIEF PESSARIUM

De beantwoording van de vragen 18 en 19 in het *N.T.v.G.* van 12 Maart 1949, zou ik als volgt willen aanvullen.

Antwoord op vraag 18: Meconiumhoudend vruchtwater ziet men nog al eens na gebruik van contractiemiddelen zoals pituitrine, compositrine enz., en bij overdragen kinderen.

Antwoord op vraag 19: Een protest! Geen rubrieken voor anticonceptie-middelen!

Voorburg, 11 Maart 1949

J. BIJLOOS

BERICHTEN



BUITENLAND

ENGELAND. — VERSCHIL VAN MENING OVER HET RHESUSVRAAGSTUK. De redactie van de *Medical Officer* sprak onlangs als haar mening uit, dat vrouwen, bij wie tegenstoffen tegen het Rhesus-antigeen zijn aangetoond, tegen nieuwe zwangerschap moeten waken. Een bekend Rhesusdeskundige is daarentegen van opvatting, dat vrouw en man in elk geval, na deskundig advies over de kwade kansen, zich zelf een mening moeten vormen. Als de man heterozygoot is, dan bestaat er 50 pCt. kans, dat het kind evenals de moeder Rh-negatief is. Maar, zelfs als de man homozygoot is, zodat elke nieuwe vrucht door de moeder zal worden aangetast, dan hangt de prognose nog van bijzonderheden af. B.v., als het laatste kind weinig schade leed, dan is er goede hoop, dat met de nieuwe middelen, die ons ten dienste staan, het volgende kind kan worden gered. Het zwaarste weegt de betrekkelijk kleine kans, dat een kind met kern-icterus, ondanks een beschadigd centraal zenuwstelsel, in leven blijft. Als een vrouw, dit alles wetende, toch verlangt opnieuw zwanger te worden (en menige vrouw verlangt dit), dan heeft de arts niet het recht haar dit af te raden (*Med. Off.*, 85, 1949).

— DE VROUWELIJKE ARTS ALS KRAAMVROUW. De *British Medical Journal* van 26 Februari bevat een rapport van de Medical Women's Federation, waarbij uitgegaan is van het denkbeeld, dat vrouwelijke artsen, die gebaard hebben, wel bijzonder competent zijn in zake de toepassing van pijnstillende middelen bij de baring. Verreweg de meeste vrouwen blijken van oordeel, dat „relief of pain in childbirth” gewenst is.

Van de bijzonderheden, die de rondvraag aan de dag bracht, treft wel het meest, dat bij 193 primiparae het 54 maal nodig werd geoordeeld de forceps te gebruiken. Zou de specialist te spoedig bezweken zijn voor het dringende collegiale verzoek er nu maar een eind aan te maken?

INDIA. — VASECTOMIE BIJ MELAATSEN. Ter gelegenheid van de All-India