

van 103.7 tot 189.6. In 1948 werd voor 400 miljoen gulden aan alcohol uitgegeven; per hoofd werd 0.85 liter wijn, 14 liter bier en 3 liter gedistilleerd gebruikt. Bij deze berekening werd uitgegaan van de prijzen in volkszaken; waarschijnlijk zijn de werkelijke uitgaven nog hoger. In 1939 werd voor 140 miljoen gulden aan alcohol uitgegeven. Voor een groot deel wordt, vooral het gedistilleerd, door de mannen gebruikt; het komt echter steeds meer in zwang, dat op schoolfeesten en dergelijke door de jongelui borrels worden gedronken en maar al te dikwijls ziet men op straat jongens, die duidelijk dronken zijn. En ten slotte zijn ook de vrouwen mee gaan drinken. De medische consultatiebureaux voor alcoholisme in Amsterdam, Rotterdam, den Haag, Groningen en enkele andere plaatsen maken melding van stijging van het aantal drankslachtoffers, in Amsterdam waren er in 1947 533 ingeschreven.

In 1948 verleende de G.G. en G.D. van Utrecht bij 1307 ongevallen eerste hulp, 68 patiënten waren stomdronken.

Het alcoholprobleem is in ons land ernstiger dan het ooit geweest is; er zullen krachtige maatregelen moeten worden genomen.

E. SLUITER

INGEZONDEN

Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten



OCCLUSIEVE PESSARIA

Naar aanleiding van Vraag 19 heeft de redactie nog verscheiden ingezonden stukken ontvangen. Ten dele sluiten deze zich aan bij de opvatting van collega J. BIJLOOS, dat voorschrijven van anti-conceptionele middelen uit een oogpunt van medische ethiek niet verantwoord is, zodat elke bespreking van de mogelijke toepassing dezer middelen uit het *Tijdschrift* behoort te worden geweerd.

Van andere zijden wordt echter opgemerkt, dat de geneeskundige, ook al aanvaardt hij geen sociale indicatie tot anti-conceptionele maatregelen, van strict geneeskundig standpunt op de hoogte behoort te zijn, welke middelen ter voorkoming van zwangerschap ten dienste staan.

Enkele technische opmerkingen, die ons nog werden toegezonden, vindt de lezer in de rubriek „Vraag en antwoord” vermeld.

De gedachtenwisseling over het onderwerp is thans gesloten.

REDACTIE

NIEUWE INZICHTEN BETREFFENDE DE RENALE GLYCOSURIE

Met veel belangstelling nam ik kennis van het overzicht over dit onderwerp van collega MEYLER in No. 11 van dit *Tijdschrift*, waarin de moderne inzichten over deze aandoening op zeer heldere wijze zijn samengevat. In het bijzonder zag ik met instemming, dat de onderstelling dat de resorptiestoornis voor glycosurie van het tubulusepitheel deel kan uitmaken van een algemene resorptiestoornis, welke zich ook in het darmslijmvlies kan ontwikkelen, door collega MEYLER wordt gedeeld.

Daarentegen trof mij de mededeling, dat de daarbij onvoldoende geachte phosphorylering door desoxycorticosteronacetaat en waarschijnlijk ook door lactoflavine kan worden opgeheven. Ik meen, dat de proeven van HOFF, de waarnemingen van RUHL en THADDEA en de ervaring van BAART DE LA FAILLE (zoals ik in het *Maandschrift voor Kindergeneeskunde*, No. 9, 1947 besprak), daarvoor geen voldoende bewijs opleveren. Zou ik collega MEYLER daarom mogen vragen, of hem sedert nieuwe argumenten voor deze stelling bekend zijn geworden?

Bussum, 11 April 1949

G. J. HUËT