

INGEZONDEN

Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten



INTERMITTERENDE BEHANDELING VAN TUBERCULOSE MET STREPTOMYCINE

Naar aanleiding van het referaat over de intermitterende behandeling van tuberculose met streptomycine, moge op het volgende worden gewezen. Deze bijzondere vorm van therapie heeft ten doel de toxische verschijnselen van de streptomycinetherapie te ondervangen.

Daar deze toxiciteit zich vooral in afwijkingen van het vestibulaire apparaat uit, zijn van otologische zijde vele onderzoeken hieromtrent verricht.

EDMUND PRINCE FOWLER Jr. 1) maakt in de eerste plaats opmerkzaam op de individuele verschillen, die veroorzaakt kunnen worden door een slechte nierfunctie, waardoor abnormaal hoge bloedspiegels ontstaan. Steeds zal men dus hierop moeten letten. Daarnaast blijven echter individuele verschillen in gevoeligheid voorkomen, en het uitbreken van urticaria, angioneurotisch oedeem, „rashes” of eosinophilie doen een allergische component vermoeden.

Uitvoerige onderzoeken verricht op een groot aantal katten, toonde inderdaad aan, dat de toxiciteit in sterke mate werd verminderd door desensibilisatie, stoornissen van het gehoor konden zelfs geheel voorkomen worden. Ook — zij het niet zo sterk — kan een gunstige invloed worden verkregen door antihistamine-prepareaten.

Tenslotte wijst FOWLER er op, dat het nog niet duidelijk is, of het hier echte desensibilisatie betreft, dan wel verworven tolerantie.

Gezien de veel geringer toxiciteit van dihydrostreptomycine, lijken deze klinische capriolen door de productie van de nieuwere antibiotica gelukkig overbodig te worden.

Zutphen, 20 Augustus 1949

M. P. LANSBERG
keel-, neus- en oorarts

AMOEBIASIS VAGINAE

Naar aanleiding van de publicatie van collega A. HEILBRUNN (*N.T.v.G.*, 93, III, 38, bl. 3268) moge ik opmerken, dat wij in het Tjihapit-vrouwenkamp te Bandoeng in het toenmalige laboratorium tweemaal uit een cervixulceratie een uitstrijk hebben vervaardigd waarin wij de vegetatieve vormen van *Entamoeba histolytica* hebben aangetoond. Emetinetherapie leidde tot zeer snelle genezing. De wijze waarop deze infectie tot stand moet zijn gekomen, is ons niet duidelijk geworden.

Hilversum, 17 September 1949

D. P. R. KEIZER

DE DAGELIJKSE CALORIEËNBEHOEFTE VAN DE MENS

In het artikel van prof. DE LANGEN mis ik een mededeling op welke wijze controle is uitgeoefend op de naleving van het dieet der diabetespatiënten. De mededeling, dat zij zich aan hun dieet gehouden hebben, mag m.i. slechts onder het grootste voorbehoud worden aanvaard. Deze opinie grond ik op de volgende overwegingen:

a. In de bezettingstijd kregen de meeste diabetespatiënten (behalve in de allerlaatste periode) nauwkeurig hun rantsoen toegewezen; daarbij klaagden bijna allen over het te geringe rantsoen.

1) E. P. FOWLER Jr., Toxicity of streptomycin. *Acta Oto-Laryngol. Suppl.* LXXVIII, blz. 193.