

beschadigd is. Dit symptoom kan men in een veel vroeger stadium waarnemen dan de pulsus inaequalis, zoals de schrijver bij 180 personen heeft nagegaan.

U. BUTTURINI en U. MARINONI. *Antidiuretische stoffen in exsudaten en in urine.* — Uit ascitesvloeistof en uit urine van lijdens aan levercirrhose kon door neerslaan met aceton een stof geïsoleerd worden, waarvan de fysisch-chemische eigenschappen overeenkwamen met die van pituitrine. De gevonden stof remde bij proeven op dieren de diurese.

H. J. KLEIN OBBINK

## INGEZONDEN

*Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten*



### MEDISCHE MISSIE NAAR KOREA

Aan de Missie van de Verenigde Naties naar Korea zal een werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie worden verbonden om te werken onder de burgerbevolking van Korea.

De werkgroep zal bestaan uit vijf medici en vijf specialisten op het gebied van de gezondheidstechniek.

Het salaris bedraagt \$ 6700—7450 per jaar, of indien de specialisten op het gebied van de gezondheidstechniek een niet-universitaire opleiding hebben: \$ 5450—6050. Voor voeding en huisvesting wordt door de militaire autoriteiten gezorgd.

Het team zal uiteraard zo spoedig mogelijk vertrekken.

Nederlanders, die genegen zijn aan dit team deel te nemen en over voldoende (tropische) ervaring beschikken, worden verzocht zich zo spoedig mogelijk met de Directeur-Generaal voor de Internationale Volksgezondheidszaken (Ministerie van Sociale Zaken, Zeestraat 73, 's-Gravenhage, telefoon 180040) in verbinding te stellen.

's-Gravenhage, 7 Augustus 1950

C. VAN DEN BERG

### BEHANDELING VAN VERRUCAE PLANAE IUVENILES MET SULFADIAZINE

De door dr K. J. PRONK in het nummer van 8 Juli jl. aanbevolen behandeling verdient mijns inziens geen navolging.

In dit *Tijdschrift* werd reeds herhaaldelijk gewaarschuwd tegen het gebruik van sulfonamides zonder dringende indicatie, omdat men te maken heeft met geneesmiddelen, die niet onschadelijk zijn voor het organisme.

Wie hiervan nog niet overtuigd is, leze de dissertatie van dr TH. J. VAN VLOTEN, onlangs verschenen, uit de Cliniek voor Huid- en geslachtsziekten te Amsterdam. In deze dissertatie worden 43 patiënten vermeld met huidafwijkingen als gevolg van sulfonamides. 28 Maal werd gegeneraliseerde dermatitis waargenomen, een ernstige afwijking dus; bij één patiënt na slechts 4 tabletten cibazol.

Men geeft sulfonamides voor een onbetekenende ziekte (griep bijvoorbeeld) waarbij het middel toch niet helpt; wanneer de patiënt dan later werkelijk ernstig ziek wordt en hij heeft de sulfonamides dringend nodig, is toediening niet meer mogelijk door allergische reacties.

Dat de nadelige invloed van sulfonamides geen grote zeldzaamheid is, waarmee geen rekening behoeft te worden gehouden, blijkt uit een onderzoek, waarbij aan de dag kwam dat 44.5 pCt van de patiënten, die in de laatste periode van hun leven sulfapraeparaten hadden gebruikt, duidelijke interstitiële myocarditis met haardvormige necroses hadden (*Am. J. Path.* 1942, 18, 109).

Een ernstige waarschuwing moet daarom gegeven worden om een onschuldige afwijking, zoals de wrat toch zeker is, niet met sulfonamides te behandelen.