

Wat betreft de blindheid door niet erfelijke ziekten merkt HOLST op, dat van de 1596 personen 945 mannen en 651 vrouwen waren. Tot op zekere hoogte weerspiegelt deze verhouding de betrekkelijke grotere blootstelling aan traumatisch blind worden van mannen dan van vrouwen. Van de 406 gevallen van blindheid door een ongeval kwamen 340 bij mannen en 66 bij vrouwen voor. De zeldzaamheid van blennorrhoea neonatorum als oorzaak van blindheid (60 gevallen) toont het nut aan van de strijd tegen deze ziekte in Noorwegen. (*J.A.M.A.*, dl 143, No 8, 1950).

E. SLUITER

## INGEZONDEN

*Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten*



### VESTIGINGSMOGELIJKHEDEN VOOR ARTSEN

De Staatssecretaris van Sociale Zaken (Volksgezondheid) heeft overleg geopend omtrent enige vraagstukken inzake vestigingsmogelijkheden voor artsen, uitgaande onder andere van de moeilijkheden, die op dit terrein voortvloeien uit de schaarste aan woonruimte. Bij dit overleg wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan de mogelijkheden voor repatriërende en jonge, pas afgestudeerde artsen; hieromheen groeperen zich andere vraagstukken.

Aan het overleg wordt, behalve door de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid en het Ministerie van Sociale Zaken, deelgenomen door het bureau van de Ziekenfondsraad, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en het Centraal Overleg van Ziekenfondsorganisaties, alsmede door de arts CHR. J. M. MOL, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Voor zover nodig zal men zich ook met andere instanties in verbinding stellen.

's-Gravenhage 30 Augustus 1950

D. K. RIJKELS

*Wvd geneeskundig hoofdinspecteur  
van de Volksgezondheid*

### DE TOEDIENING VAN HEPARINE BIJ EEN LONGEMBOLUS

Naar aanleiding van Vraag 42 (*N. T. v. G.* 94, blz. 2351, 1950) zou ik de aandacht willen vestigen op de bijzondere betekenis van intraveneuze eupaverine-injecties bij longembolie. Door onmiddellijke intraveneuze toediening van 4 cm<sup>3</sup> (0.12 g) eupaverine kan de spastische contractie van de arteria pulmonalis op de plaats van de embolus worden opgeheven en het leven van de patiënt gered. Natuurlijk wordt daardoor de toepassing van heparine niet overbodig.

Amsterdam, 16 Augustus 1950

H. FERIZ

### RODE HOND OF EEN NIEUWE ZIEKTE?

Naar aanleiding van de mededeling van prof. VAN GILSE (*N. T. v. G.* 94, blz. 2504) deel ik hier mede, dat ook te Hilversum en omgeving deze „nieuwe ziekte” zich voordoet. Voor zover eigen ervaring strekt, gaat het hier *niet* om rubeola, maar om gevallen van 5de ziekte (erythema infectiosum) met het kenmerkende confluëren der erupties vooral aan de strekzijden der extremiteiten en de wangen. Verder ziet men onder deze exanthematische aandoening nogal eens een toxicodermie, meestal tengevolge van sulfonamide-ge(mis)bruik.

In twijfelachtige gevallen late men het tellen en differentiëren der leucocyten niet achterwege alvorens om reconvalescentenserum eventueel gammaglobuline voor de bedreigde zwangeren te vragen.

Hilversum, 26 Augustus 1950

D. P. R. KEIZER