

INGEZONDEN

Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten



RECIDIVERENDE ERYSIPELAS IN DE TROPEN

Naar aanleiding van Uw antwoord op vraag 51 in No 37 van ons *Tijdschrift* een korte aanvulling op grond van een 38-jarige Indische ervaring.

Ik heb de telkens recidiverende erysipelas aan de onderste ledematen herhaaldelijk aangetroffen bij patiënten, Nederlanders, uitgaand van het zeer veel voorkomende eczeem tussen de tenen. De oorzaak van dit eczeem is de zeer hoge vochtigheidstoestand en het veelvuldig baden zonder de ruimte tussen de tenen goed en voorzichtig te drogen. De zeer eenvoudige behandeling is zorgvuldig drogen en poederen met fijn boorzuurpoeder.

Misschien is de vragende collega gebaat met deze aanvulling van het antwoord. Met enig bericht over een eventueel resultaat zal de bewuste collega mij zeer verplichten.

's-Gravenhage, 17 September 1950

H. KRUYNE, arts,
Zilverschoonstraat 8

GLAUCOOM NA ATROPINE

Naar aanleiding van het referaat van collega MANSCHOT in het *Tijdschrift* van 2 Sept. jl. over glaucoom na atropine per os kan ik mijn volgende ervaring mededelen.

Op 27 Dec. 1948 kwam de 67-jarige mevrouw X onder mijn behandeling met een acute gastro-enteritis. Ik schreef haar poeders voor met $\frac{1}{2}$ g salicyl. bismuth. + 10 mg extr. belladonnae, 4 maal daags 1 poeder. Patiënte had nooit enige oogziekte gehad.

29 December 1948 werd ik bij haar geroepen, omdat zij zich ellendig voelde, braakte, hoofdpijn had en een pijnlijk linker oog. Zij bleek een heftige aanval te hebben van acuut glaucoom van het linker oog.

Zij werd terstond opgenomen in het oogziekenhuis te Rotterdam en door collega VERBEEK conservatief behandeld met pilocarpine; zij genas gelukkig geheel. Zij heeft tot op heden geen last van het oog meer gehad, doch ik heb haar nooit meer belladonna voorgeschreven.

Brielle, 13 September 1950

A. O. H. TELLEGEN

KOEPOKKEN

Naar aanleiding van het artikel: Encephalomyelitis na besmetting met koe-pokken (*N. T. v. G.* 94, blz. 2603), waarin twijfel wordt uitgesproken over de besmetting van koeien met vaccinia-virus (blz. 2607 onderaan), wil ik herinneren aan het geval, dat ik beschreef in het *N. T. v. G.* 86, blz. 2185, 1942. Hoewel ook in dit geval het absolute bewijs niet werd geleverd, was het toch wel suggestief voor bovenstaande opvatting.

Na inenting van het jongste kind in een (sterk vervuild) arbeidersgezin, kregen de koeien op het bedrijf waar twee gezinsleden als melkknechts waren, zere spenen. Later werden beiden op hun beurt door de koeien besmet, blijkens de kenmerkende efflorescenties, die zich bij hen ontwikkelden.

Groningen, 13 September 1950

B. H. WORMGOOR

VAGITUS UTERINUS

Naar aanleiding van het artikel over „baarmoederkrijten”, door collega M. E. KULSDOM (*N. T. v. G.* 1950, 9 September, blz. 2617) wil ik het volgende geval mededelen: Bij een primipara stelde ik uitwendig de diagnose op stuitligging