

8e. Sulfadiazine bekort in het algemeen bacillaire dysenterie. Uitscheiders van resistente dysenterie-bacteriën reageren vaak vlot op orale streptomycine-toediening.

9e. Patiënten lijdend aan paratyphus B schottmüller worden in enkele dagen koortsvrij, indien men hun chloromycetine geeft.

10e. Aureomycine-medicatie deed herpes zoster niet lichter verlopen dan zonder geneesmiddel het geval was.

11e. Dihydrostreptomycine langer dan 3 maanden intramusculair en intralumbaal ingespoten, verwekt in dezelfde dosering bij volwassenen in een zeer veel groter aantal gevallen doofheid, dan bij het gebruik van streptomycine werd gezien.

12e. Bij bacteriaemieën, die purulente meningitides begeleiden (pneumococci, staphylococci) is een dosering van 8 maal 50.000 E. penicilline per dag gewoonlijk voldoende om de patiënt te genezen.

13e. Bij purulente meningitides heeft de intralumbale inspuiting van 2500—20.000 E. penicilline (afhankelijk van de leeftijd), opgelost in 2.5—20 ml zoutoplossing, nimmer nadelige gevolgen, mits men tevoren de dubbele hoeveelheid lumbaal vocht heeft afgetapt. Indien men deze methodiek volgt, behoeft men per dag slechts 100.000—400.000 E. penicilline intramusculair in te spuiten.

14e. Patiënten met mazelen en kinkhoestpneumonie die resistent zijn voor sulfapraeparaten en penicilline, zijn in den regel onmiskkenbaar gevoelig voor streptomycine, ook in geval van recidief.

Uit de literatuur kreeg ik de indruk, dat:

a. de combinatie penicilline en streptomycine bij actinomycose meer vermag dan die van penicilline en sulfapraeparaten;

b. Kl. pneumoniae-infecties zeer vlot op streptomycine reageren. Bij de zelden waargenomen resistentie kan men altijd nog op aureomycine overgaan;

c. de in ons land thans niet voorkomende tularaemie en pest na streptomycine-toediening zeer snel genezen;

d. een groot aantal lijdens aan tegen penicilline resistente endocarditis lenta met streptomycine herstellen.

Amsterdam, 7 October 1950

J. E. MINKENHOF

ENQUÊTE ONDER LIJDERS AAN DIABETES

De Nederlandse Vereniging van Suikerzieken heeft het plan opgevat, onder haar omstreeks 12.000 leden een enquête te houden over het voorkomen van impotentie bij mannelijke diabeteslijders. Mochten er artsen zijn, die belangstelling hebben voor andere vraagstukken welke op diabetes mellitus betrekking hebben en per enquête zouden kunnen worden behandeld, dan worden zij verzocht, hiervan opgave te doen aan ondergetekende, waardoor hun vragen dan tegelijkertijd aan de diabeteslijders kunnen worden voorgelegd. Het antwoord zal ter beschikking van de vragers worden gesteld.

Leiden, 5 October 1950
Postbus 101

F. GERRITZEN, medisch adviseur

VERWIJDEREN VAN VREEMDE VOORWERPEN UIT DE LONG

In de pers verscheen onlangs een bericht over een patiënte met een speld in de long, aan wie was aangeraden zich in Amerika te laten behandelen.

Ik vraag mij toch af, of men in een dergelijk geval niet hulp in eigen land kan verkrijgen, met name als het misschien ligt aan gemis van bepaald instrumentarium.

Langs deze weg zou ik de collega's, die misschien een soortgelijk geval in hun practijk ontmoeten, erop willen wijzen, dat de kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Leiden beschikt over instrumenten in het bijzonder bedoeld voor het verwijderen van dergelijke voorwerpen ook uit fijnere vertakkingen aan de